



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
UNIDADE ACADÊMICA DE GARANHUNS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL E PASTAGENS

DIGESTIBILIDADE DE GRAMÍNEAS TROPICAIS ENCONTRADAS NO
SEMIÁRIDO NORDESTINO ESTIMADA ATRAVÉS DA TÉCNICA DE SACOS
MÓVEIS EM EQUINOS

ALISSON HERCULANO DA SILVA

GARANHUNS – PE
JULHO / 2019



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
UNIDADE ACADÊMICA DE GARANHUNS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL E PASTAGENS

DIGESTIBILIDADE DE GRAMÍNEAS TROPICAIS ENCONTRADAS NO
SEMIÁRIDO NORDESTINO ESTIMADA ATRAVÉS DA TÉCNICA DE SACOS
MÓVEIS EM EQUINOS

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Pastagens da Universidade Federal Rural de Pernambuco, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciência Animal e Pastagens.

Área de concentração - Nutrição de Equinos

Aluno – Alisson Herculano da Silva

Orientador – Prof. DSc. Jorge Eduardo C. Lucena

Co-orientador – Prof. DSc. Juliano M. Santiago

Co-orientador – Prof. DSc. Victor Netto Maia

GARANHUNS – PE

JULHO / 2019

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Universidade Federal Rural de Pernambuco
Sistema Integrado de Bibliotecas
Gerada automaticamente, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

S586d Silva, Alisson Herculano da
DIGESTIBILIDADE DE GRAMÍNEAS TROPICAIS ENCONTRADAS NO SEMIÁRIDO NORDESTINO
ESTIMADA ATRAVÉS DA TÉCNICA DE SACOS MÓVEIS EM EQUINOS / Alisson Herculano da Silva. - 2019.
48 f.

Orientador: Prof DSc Jorge Eduardo C Lucena.
Coorientador: Prof DSc Juliano M Santiago.
Inclui referências.

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Pastagens , Garanhuns, 2020.

1. Cavalos. 2. Forragens. 3. Valor nutricional. I. Lucena, Prof DSc Jorge Eduardo C , orient. II. Santiago, Prof DSc Juliano M , coorient. III. Título

CDD 636.089

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIDADE ACADÊMICA DE GARANHUNS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL E PASTAGENS

Autor: Alisson Herculano da Silva

Orientador: Prof. DSc Jorge Eduardo Cavalcante Lucena

Co-orientador: Prof. DSc Juliano Martins Santiago

Co-orientador: Prof DSc Victor Netto Maia

DIGESTIBILIDADE DE GRAMÍNEAS TROPICAIS ENCONTRADAS NO
SEMIÁRIDO NORDESTINO ESTIMADA ATRAVÉS DA TÉCNICA DE SACOS
MÓVEIS EM EQUINOS

Titulação: Mestre em Ciência Animal e Pastagens

Data da defesa: ___/___/___

Banca Examinadora:

Profª. DSc. Fernanda Melo Pereira Taran – UNIVASF

Prof. DSc. Alberício Pereira de Andrade – UAG-UFRPE

Prof. DSc Jorge Eduardo Cavalcante Lucena – UAG/UFRPE
(Orientador)

Acredite e não se explique,
pois poucos vão entender,
só se compreende um sonho
se o sonhador for você.
Há quem possa lhe animar,
há quem possa duvidar,
há quem lhe faça seguir.
Mas não descuide um segundo
pois muita gente no mundo
quer lhe fazer desistir

Acredite, pense e faça,
use sua intuição,
transforme sonho em suor,
pensamento em ação.
Enfrente cada batalha
sabendo que a gente falha
e que isso é natural,
cair pra se levantar,
aprender pra ensinar
que o bem é maior que o mal.

Bráulio Bessa

AGRADECIMENTOS

À Universidade Federal Rural de Pernambuco e ao Programa de Pós Graduação em Ciência Animal e Pastagens, pela oportunidade de cursar um mestrado, proporcionando acúmulo de conhecimento à minha jornada acadêmica.

À Coordenação de Aperfeiçoamento a Pessoas de Nível Superior (CAPES), pela concessão da bolsa de estudos e apoio a pesquisa.

Aos funcionários da Fazenda Experimental da Unidade Acadêmica de Garanhuns (UFRPE-UAG), por todo o apoio na realização do experimento.

Ao Haras Maraba, pela doação dos animais utilizados no experimento a campo.

À Clínica de Bovinos, na pessoa do Dr. Nivaldo de Azevêdo Costa, por viabilizar a vinda dos animais do haras até a Fazenda Experimental da UAG.

Ao professor, coorientador e amigo Dr. Victor Maia, por toda a ajuda durante o experimento, além de disponibilizar seu animal diante momento de dificuldade para realização do experimento.

Ao orientador e amigo Dr. Jorge Lucena, pela grande contribuição a minha jornada acadêmica, e toda a ajuda durante o mestrado, participando efetivamente de todas as etapas do experimento, assim como valiosa contribuição na elaboração do referido trabalho.

Ao professor, coorientador e amigo Dr. Juliano Santiago, pelos importantes ensinamentos durante o mestrado, e grande contribuição na escrita do presente trabalho.

Aos amigos do Horse Team: Daniel Melo, Juliete Amanda, Iaçanã Valente, Caline Menezes e Luis Arthur, pelo apoio durante o mestrado e grande ajuda na realização do experimento e análises.

Aos amigos Djanira Paula e Hemerson Xavier, por todo o apoio e companheirismo durante todo o experimento.

Aos amigos Diego Cunha e Raquel Lima, pela grande ajudar na realização das análises *in vitro*, que não teriam sido possíveis sem a contribuição de vocês, assim como Juliete Amanda, que foi de suma importância para o mesmo, muito obrigado!

Aos amigos José Fabio e Jordânia Kelly, por toda a ajuda e contribuição nas análises bromatológicas.

Aos amigos Pedro de Assis e Daniel Melo, pelo companheirismo e momentos de descontração e estudos durante o mestrado.

Aos amigos do PPGCAP Luiz Torres, Jessica Maria, Caline Menezes, Paulo Godoy, José Fabio, Juliete Amanda, Diego Cunha, Raquel Lima, Jordânia Kelly, Marcelo, Leandro,

Daniel Melo, Pedro de Assis, Mery, Diana e Steyce, por todo o companheirismo e momentos de descontração durante a jornada do mestrado.

Aos meus pais e familiares, por todo o apoio durante mais uma etapa da minha vida.

Aos amigos do grupo de estudos GEQUAM, em especial a Damilly, Edson, Erlaine, Aldo, Diogo, Renner, Inácio e Beto por toda a ajuda na realização do experimento a campo.

Aos amigos do grupo LABRAPE, por toda a ajuda na realização do experimento a campo.

A todos que de certa forma contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste trabalho, meu mais sincero muito obrigado!

RESUMO

SILVA, Alisson Herculano. **Digestibilidade de gramíneas tropicais encontradas no semiárido nordestino estimada através da técnica de sacos móveis em equinos.** 2019. 46p. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal e Pastagens) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Garanhuns, PE.

O objetivo do presente estudo foi estimar a digestibilidade dos nutrientes de gramíneas tropicais encontradas no Semiárido do Nordeste brasileiro, através da técnica de sacos móveis em equinos. Foram utilizados cinco equinos, fêmeas, de raça não definida, com peso médio de 400 Kg e idade média de 8,6 anos. Distribuídos em delineamento experimental quadrado latino 5 x 5, sendo cinco espécies de gramíneas e cinco períodos. A dieta dos equinos foi exclusiva de feno de Tifton 85 (*Cynodon spp.*). Os animais receberam o equivalente a 2,0% do peso vivo em matéria seca por dia. Os tratamentos foram compostos pelas gramíneas: feno de Tifton 85 (*Cynodon spp.*), capim Panasco (*Aristida adsencionis*, Linn), capim Milhã (*Brachiaria plantaginea* (Link) Hitchc), capim de Raiz (*Chloris orthonoton*, Doell) e capim Corrente (*Urochloa mosambicensis*). Os nutrientes avaliados foram: Matéria seca, matéria orgânica, matéria mineral, proteína bruta, fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido. O experimento teve duração de 63 dias, sendo os 28 primeiros dias destinados à adaptação dos equinos às baias e dieta. Os dados foram analisados através de análise de variância pelo programa “*Statistical Analysis System*” com nível de significância de 5%. Houve diferença ($P < 0,05$) entre os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes das gramíneas avaliadas pela técnica de sacos móveis. Os capins Tifton 85 (74,61%), Milhã (74,30%) e Raiz (68,88%) apresentaram maior ($P < 0,05$) coeficiente de digestibilidade para a matéria seca, em relação aos capins Panasco (48,40%) e Corrente (52,89%). Por outro lado, o capim Panasco demonstrou alta digestibilidade da proteína bruta (cerca de 93,35%), igualando-se ao capim Milhã (95,70%) e Tifton 85 (93,50%). Em relação à digestibilidade aparente da matéria mineral, apenas a do capim Panasco foi diferente ($P < 0,05$) das demais gramíneas. Em conclusão, a digestibilidade dos nutrientes de gramíneas tropicais encontradas no Semiárido nordestino, estimada através da técnica de sacos móveis em equinos, apresenta diferença entre as espécies.

Palavras-chave: Cavalos, Forragens, Valor nutricional.

ABSTRACT

SILVA, Alisson Herculano. **Digestibility of tropical grasses found in the northeastern semiarid estimated through the mobile bag technique in horses.** 2019. 46p. Dissertation (Master in Animal Science and Pastures) - Federal Rural University of Pernambuco, Academic Unit of Garanhuns, PE.

The aim of the present study was to estimate the digestibility of nutrients from tropical grasses found in the semiarid region of Northeast Brazil, using the mobile bag technique in horses. Five female horses, crossbreeds, with an average weight of 400 kg and an average age of 8.6 years were used. Distributed in a 5 x 5 Latin square experimental design, with five grass species and five periods. The horses diet was exclusive of Tifton 85 hay (*Cynodon* spp.). The animals received the equivalent of 2.0% of the live weight in dry matter per day. The treatments were composed of grasses: Tifton 85 hay (*Cynodon* spp.), Panasco grass (*Aristida adsencionis*, Linn), Milhã grass (*Brachiaria plantaginea* (Link) Hitchc), Raiz grass (*Chloris orthonoton*, Doell) and Corrente grass (*Urochloa mosambicensis*). The evaluated nutrients were: Dry matter, organic matter, mineral matter, crude protein, neutral detergent fiber and acid detergent fiber. The experiment lasted 63 days, with the first 28 days destined to the adaptation of the horses to the stalls and diet. The data were analyzed through analysis of variance by the program "*Statistical Analysis System*" with a significance level of 5%. There was a difference ($P<0.05$) between the digestibility coefficients of the grass nutrients evaluated by the mobile bag technique. The Tifton 85 (74.61%), Milhã (74.30%) and Raiz (68.88%) grasses presented a higher ($P<0.05$) digestibility coefficient for dry matter, compared to Panasco grasses (48.40%) and Corrente (52.89%). On the other hand, Panasco grass showed high digestibility of crude protein (about 93.35%), being equal to Milhã (95.70%) and Tifton 85 (93.50%). Regarding the apparent digestibility of mineral matter, only that of Panasco grass was different ($P<0.05$) from the other grasses. In conclusion, the digestibility of nutrients from tropical grasses found in the Northeastern semi-arid region, estimated through the mobile bag technique in horses, presents a difference between species.

Keywords: Forages, Horses, Nutritional value.

Sumário

1 INTRODUÇÃO	13
2 OBJETIVO	14
3 REVISÃO DE LITERATURA	14
3.1 Semiárido e Caatinga	14
3.2 Equinocultura no Nordeste	15
3.3 Gramíneas	16
3.3.1 Tifton 85 (<i>Cynodon</i> spp.).....	17
3.3.2 Capim Panasco (<i>Aristida adsencionis</i> Linn.).....	18
3.3.3 Capim Milhã (<i>Brachiaria plantaginea</i> (Link) Hitchc).....	19
3.3.4 Capim de Raiz (<i>Chloris orthonoton</i> , Doell)	19
3.3.5 Capim Corrente (<i>Urochloa mosambicensis</i>)	20
3.4 Métodos de estimativa de digestibilidade	21
3.4.1 Técnica dos sacos móveis em equinos.....	23
3.4.2 Técnica de digestibilidade <i>in vitro</i>	25
4 REFERÊNCIAS	29
5 CAPÍTULO I – DIGESTIBILIDADE DE GRAMÍNEAS TROPICAIS ENCONTRADAS NO SEMIÁRIDO NORDESTINO ESTIMADA ATRAVÉS DA TÉCNICA DE SACOS MÓVEIS EM EQUINOS¹	37
5.1 RESUMO	37
5.2 INTRODUÇÃO	38
5.3 MATERIAL E MÉTODOS	38
5.3.1 <i>Local</i>	38
5.3.2 <i>Animais</i>	39
5.3.3 <i>Delineamento experimental</i>	39
5.3.4 <i>Processamento das amostras</i>	39
5.3.5 <i>Preparação dos sacos móveis</i>	40
5.3.7 <i>Duração do experimento</i>	41
5.3.8 <i>Coletas</i>	41
5.3.9 <i>Análises estatísticas</i>	42
5.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	42

5.5 CONCLUSÃO	45
5.6 AGRADECIMENTOS.....	45
5.7 REFERÊNCIAS	46

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Composição bromatológica das gramíneas.....40

Tabela 2 – Digestibilidade dos nutrientes de gramíneas tropicais estimada através da técnica de sacos móveis em equinos.....43

1 INTRODUÇÃO

A região do Semiárido nordestino é caracterizada pelo predomínio do bioma Caatinga, cuja vegetação compreende estratos herbáceos, arbustivos e arbóreos. Esta região apresenta clima seco e quente, com irregularidade na distribuição das chuvas. Tais fatores climáticos propiciaram o desenvolvimento de uma vegetação própria e altamente adaptada, cuja morfologia e fisiologia permitem seu desenvolvimento nessas condições edafoclimáticas. Porém, em virtude da sazonalidade das chuvas, observa-se que a oferta de forragem é irregular ao longo do ano, influenciando o baixo desempenho dos rebanhos, em geral (SANTOS, 2008).

Segundo o IBGE (2017), dos mais de 5,58 milhões de equinos criados do Brasil, cerca de 23,2% encontram-se no Nordeste. Esses animais são classificados como não ruminantes, pastejadores e de hábito gregário (MEYER, 1995), que têm como base alimentar pastagens. Entretanto, no Brasil a maioria das pastagens utilizadas na alimentação de equinos são de espécies exóticas, devido ao maior conhecimento sobre a composição e digestibilidade dessas forrageiras, além disso são mais exploradas comercialmente, com métodos de propagação e cultivo mais conhecidos dentre os produtores. Todavia, essas espécies são oriundas de regiões com condições edafoclimáticas muito diferentes do Semiárido, sendo algumas pouco adaptadas às condições semiáridas, o que onera os custos de implantação e manutenção (DIAS FILHO, 2014).

No bioma Caatinga existem cerca de 4.478 espécies vegetais, sendo 812 endêmicas (SIQUEIRA FILHO et al., 2012), e destas 37 pertencem a família *Gramineae* (GIULIETTI et al., 2003). Contudo, algumas apresentam baixo valor nutritivo, geralmente devido à presença de compostos secundários, comumente associados à sobrevivência da planta em condições de escassez de água ou nutrientes (ARAÚJO FILHO et al., 2002; ZANINE et al., 2005).

Além disso, poucos estudos foram conduzidos com o intuito de determinar a composição químico-bromatológica, consumo e digestibilidade dos volumosos da Caatinga pelos equinos. A escassez dessas informações leva à elaboração de dietas balanceadas baseadas em gramíneas de outras regiões, subestimando muitas vezes os valores da fração volumoso, que constitui cerca de 50% ou mais da alimentação diária dos equinos (MOSS, 2012).

A digestibilidade de um alimento é definida como a fração do alimento ingerido que não é encontrado nas fezes (BERCHIELLI et al., 2006). Segundo van Soest (1994), a

digestibilidade é um dos principais fatores que determinam o valor nutritivo de um volumoso, como também seu consumo alimentar e eficiência energética.

Diferentes métodos são utilizados para estimar a digestibilidade das forragens na espécie equina, contudo os resultados podem variar conforme a técnica adotada. Os métodos *in vivo* são os mais usados e confiáveis, pois são estudados no próprio animal, porém, exigem maior número de repetições, maior volume de amostras, controle mais rigoroso da ingestão e excreção pelo animal, alto custo de implantação, além de preocupações com o bem-estar animal em experimentos (BERCHIELLI et al. 2006).

2 OBJETIVO

Estimar a digestibilidade de gramíneas tropicais encontradas no Semiárido Nordeste Brasileiro, através das técnicas de sacos móveis e *in vitro*, em equinos.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Semiárido e Caatinga

O Nordeste brasileiro é a terceira maior sub-região do país, com área aproximada de 1.561.177,8 Km², abrangendo nove estados. Segundo o Ministério da Integração Nacional, cerca de 72% do território nordestino está inserido no contexto de região semiárida (BRASIL, 2017). O Semiárido brasileiro apresenta características próprias, com temperaturas médias anuais entre 20° e 30°C e precipitação média anual que varia entre 300 e 800 milímetros, que comumente ocorre em eventos irregulares em forma de pulsos de relativa curta duração, e estação seca, que perdura de sete a oito meses ao ano (NOY-MEIR, 1973; ARAÚJO, 2011; SOUZA et al., 2013).

A maior parte do território semiárido do Nordeste brasileiro é coberto pelo bioma Caatinga. A Caatinga possui vegetação constituída, especialmente, de espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas de pequeno porte, com maiores frequências de espécies das famílias *Leguminosae*, seguida da *Cactaceae*, *Mimosaceae*, *Euphorbiaceae*, *Fabaceae*, dentre outras (GIULIETTI et al., 2003; ARAÚJO FILHO, 2013). Estima-se cerca de 4.900 espécies de Angiospermas no domínio Caatinga, sendo aproximadamente 1088 endêmicas (BRASIL, 2019).

Embora a Caatinga apresente grande variedade de espécies vegetais, a disponibilidade para os animais em pastejo é limitada, devido ao caráter temporário dessas espécies vegetais, principalmente do estrato herbáceo, disponível durante curto período do ano (SOUSA et al., 2000). Além disso, muitas plantas podem conter substâncias que diminuem sua atratividade, por apresentarem fatores antinutricionais, como: compostos cianogênicos, taninos, alcalóides, nitratos e terpenóides, cuja síntese e acúmulo estão associados à adaptação das plantas à variação edafoclimáticas do *habitat* (ANDRADE et al., 2010).

Visando contornar essa limitação, muitos produtores rurais delimitam grandes áreas de pastagens, formadas geralmente por gramíneas exóticas, predominando espécies de origem africana, principalmente dos gêneros *Cenchrus*, *Urochloa* e *Andropogon* que, segundo Andrade et al. (2010), podem elevar a oferta de forragem na época seca do ano, e que na maioria dos estados do Nordeste compõem aproximadamente 60% da área total de vegetação (GIULIETTI et al., 2003). Contudo, a implantação de pastagens formadas por espécies exóticas, além de representar desequilíbrio ao ecossistema da Caatinga, pode aumentar os custos da produção (ALVES FILHO et al., 2003).

3.2 Equinocultura no Nordeste

Existem duas teorias sobre a chegada dos primeiros equinos ao Nordeste brasileiro. A primeira diz que ocorreu na capitania de Pernambuco, no ano de 1535, quando Duarte Coelho e sua esposa aportaram em terras brasileiras, trazendo consigo alguns exemplares de cavalos domésticos (GOULART, 1964).

Entretanto, a segunda teoria e única com registro oficial, menciona que os cavalos só chegaram ao Brasil em 1549, com a chegada de Tomé de Sousa, à então primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador na Bahia, para ser o primeiro governador geral da colônia, e seu filho Garcia D'Ávila seria responsável pela disseminação dos cavalos pelo Nordeste (BANDEIRA, 2000).

Além da introdução remota dos equinos no Nordeste, o ciclo do açúcar trouxe riqueza e desenvolvimento à região, tornando indispensável, cavalos e muares para lida com o gado, força motriz, bem como o aumento das tropas para transportar a cana em terrenos acidentados. Contudo, a concorrência entre a atividade canavieira e a pecuária, levou a coroa portuguesa a regulamentar a Carta Régia de 1701, proibindo a criação de animais nas regiões

litorâneas e de mata do Nordeste, contribuindo assim para a interiorização da pecuária bovina e, conseqüentemente, disseminação dos equídeos para o sertão (BRASIL, 2004).

Atualmente, o Brasil possui o quarto maior rebanho de equinos do mundo, com cerca de 5,58 milhões de cabeças, ficando atrás apenas de Estados Unidos, México e China (FAO, 2017). A região Nordeste possui o maior rebanho do país, com 23,2% do efetivo nacional, com destaque para o estado da Bahia com aproximadamente 404,670 milhões de cabeças, como também, possui os maiores rebanhos nacionais de asininos e muares (IBGE, 2017).

Os equinos são produzidos para diversas finalidades, tais como, atividades esportivas, lazer, equoterapia e uso militar, contudo, mais de 52% continuam atuando em atividades agropecuárias, principalmente, para o manejo do gado (BRASIL, 2016).

Recentemente os esportes equestres vêm ganhando destaque no Nordeste, dentre eles o de maior expressão é a vaquejada, mas também são bastante difundidas na região as pegas de boi no mato, provas de tambor e corridas. A vaquejada gera cerca de R\$ 164 milhões por ano, ocupando 1430 pessoas de forma permanente (BRASIL, 2016). Deve-se destacar que atualmente as vaquejadas são eventos de grande porte, não limitando-se apenas ao esporte, mas também leilões de animais, apresentações musicais e outras atrações para o público, com grande valor para a economia da região.

3.3 Gramíneas

A *Gramineae* é uma das maiores famílias de Angiospermas com distribuição cosmopolita, contando com cerca de 1.400 espécies no Brasil, sendo 498 endêmicas (FILGUEIRAS & SANTOS GONÇALVES, 2004; GIBSON et al., 2009; BRASIL, 2019).

Essas plantas apresentam crescimento cespitoso, estolonífero ou rizomatoso, com raízes fasciculadas e caule em forma de colmo, que podem ser eretos ou prostrados (rente ao solo), folhas simples e incompletas, sem presença de pecíolo, compostas por bainha, lígula e lâmina foliar, com nervura paralelinérvea. Suas flores são incompletas, com ausência de cálice e coroa, e podem ser chamadas de espiguetas ou espículas, com inflorescência em forma de espiga, panícula ou racemo e frutos do tipo cariopse (SILVA et al., 2008). De acordo com Santos et al. (2009), as gramíneas foram as espécies quantitativamente mais importantes na dieta de ovinos, mantidos na Caatinga, durante o período chuvoso. As pastagens brasileiras são formadas predominantemente por espécies de gramíneas nativas e introduzidas, as quais precisam apresentar características genéticas, morfológicas e

fisiológicas de adaptação para sua permanência no ambiente semiárido (FONSECA et al., 2010).

O consumo animal depende da preferência da espécie animal, bem como do estágio de desenvolvimento das plantas e da presença de fatores antinutricionais, que são metabólitos produzidos em resposta ao ambiente hostil. Estes fatores podem interferir na palatabilidade e no valor nutricional das mesmas, sendo comumente encontrados em espécies da região semiárida do Brasil (ANDRADE et al., 2010; LIMA JÚNIOR et al., 2010).

Os equinos são classificados como animais pastejadores, com alta capacidade seletiva, que preferem consumir gramíneas (DITTRICH et al., 2010). Entretanto, pouco se sabe sobre o valor nutricional das gramíneas forrageiras da Caatinga consumidas pelos equinos no período de maior disponibilidade.

No Nordeste, onde o principal fator limitante na criação de equinos é a oferta de matéria seca ao longo do ano, as gramíneas encontradas na Caatinga apresentam bom potencial para alimentação de ruminantes e teoricamente para equinos, em termos de composição química. Alencar et al. (2010) observaram teores proteicos entre 11 e 13 % de PB/kg de MS, 69% de FDN/Kg de MS e digestibilidade *in vitro* de aproximadamente 50% em ruminantes, em seis espécies de gramíneas da Caatinga submetidas a diferentes lâminas de irrigação nas quatro estações do ano. Semelhantes aos valores encontrados por Castagnara et al. (2011), ao estudarem a influência da adubação nitrogenada em três forrageiras tropicais *Panicum maximum* cvs. Tanzânia e Mombaça, e *Brachiaria* sp. cv. Mulato, relataram valores médios entre 9 e 10 % de PB.Kg⁻¹MS e de 71% de FDN.Kg⁻¹MS.

3.3.1 Tifton 85 (*Cynodon* spp.)

O gênero *Cynodon* é dividido em dois grandes grupos, de acordo com a presença (Bermuda) ou não (Estrela), de rizomas. Com o intuito de obter plantas melhoradas geneticamente, adaptadas às diversas condições de exploração, solo e precipitação, um grande número de cultivares do capim Bermuda foram desenvolvidos, dentre eles o híbrido capim Tifton.

Esses híbridos são melhores em relação a grama Bermuda comum, por responderem melhor à adubação nitrogenada, serem mais produtivos, perenes, de melhor qualidade e mais tolerantes às condições de clima tropical e subtropical (ATHAYDE et al., 2005). São ainda preferidos para manejo intensivo que requer alta produtividade, sendo indicados tanto para

pastejo, quanto para produção de feno devido sua alta capacidade de suporte. No Brasil, estão disponíveis os híbridos *Coast-Cross*, Alícia, Callie, Tifton 44, Tifton 68, Tifton 78 e Tifton 85 (FONSECA et al., 2010).

O cultivar Tifton 85 é resultado do programa de melhoramento genético desenvolvido pelo professor Glenn W. Burton, na Coastal Plain Experiment Station, da Universidade da Geórgia, localizada na cidade de Tifton, no estado da Geórgia. Lançado em 1992, é considerado o melhor híbrido já desenvolvido naquela universidade. É um cultivar resultante do cruzamento do Tifton 68 com uma espécie proveniente da África do Sul, provavelmente o *Cynodon dactylon* (FONSECA et al., 2010).

O Tifton 85 apresenta boa resposta à adubação, não possui sementes viáveis e seu plantio é realizado por meio de mudas, em sulcos ou a lanço, sendo o sistema de sulcos mais eficiente (BOTREL et al., 1998). Em relação ao ciclo de vida, são perenes, necessitando de pluviometria entre 650 e 1000 mm/ano e temperatura ideal de 37° C.

O cultivar apresenta relação folha/colmo e produtividade superior ao Tifton 68 (HILL et al., 1993), o que lhe confere melhor qualidade, além de ser mais adequado para os hábitos alimentares dos equinos, bem como para fenação. (DITTRICH et al., 2010). Segundo Valadares Filho (2000), o feno de Tifton 85 apresenta aproximadamente 120 g.Kg⁻¹MS de proteína bruta e digestibilidade *in vitro* da matéria seca em torno de 55,6% em bovinos. Fioreli et al. (2018), estudaram o valor nutritivo de gramíneas do gênero *Cynodon* consorciadas com amendoim forrageiro e encontraram valores de cerca 160 g.Kg⁻¹MS para PB e 54,85% de digestibilidade *in vitro* para o cultivar Tifton 85 para ruminantes. Dependendo das condições de adubação e precipitação, o Tifton 85 apresenta produção de matéria seca em média de 18,6 Mg.ha⁻¹, com valores de proteína bruta que variam de 90 a 140 g.Kg⁻¹MS e digestibilidade *in vitro* média de 60%, em bovinos. Os intervalos entre cortes geralmente recomendados para os capins do gênero *Cynodon* situam-se na faixa de 4 a 6 semanas (FONSECA et al., 2010).

3.3.2 Capim Panasco (*Aristida adsencionis* Linn.)

O capim Panasco (*Aristida adsencionis* Linn.) é uma espécie forrageira nativa da Caatinga, da família Gramínea, de hábito anual, com colmos finos e eretos, ramificados a partir da base, alcançando até 90 cm de altura, folhas estreitas e delicadas, panículas estreitas e frouxas e glumas providas de arista tripartida (SILVA et al., 2000).

A espécie é tida como um bom indicador de solos degradados e encontra-se presente em extensas áreas do Semiárido brasileiro, sendo uma das mais importantes forrageiras

disponíveis na dieta de caprinos e ovinos durante o período seco no Semiárido (SILVA et al., 2000). Murthy & Ravindra (1975) avaliaram o potencial alelopático desta gramínea e constataram que ela inibe as bactérias fixadoras de nitrogênio do solo, exercendo dominância sobre outras espécies vegetais.

Silva (2017) avaliou a produção de biomassa e composição bromatológica do capim Panasco em quatro condições de substratos, sem adubação, adubação com esterco bovino, adubação com esterco caprino e adubação com húmus. Os valores de matéria seca das folhas e do colmo não diferiram ($P>0,05$), com 39,48; 38,92; 41,04 e 45,81%, respectivamente para folhas, e 40,50; 37,86; 35,93 e 45,47%, respectivamente para colmo.

3.3.3 Capim Milhã (*Brachiaria plantaginea* (Link) Hitchc)

O capim Milhã é uma espécie forrageira de ciclo anual, que apresenta elevado potencial para pastagem para espécie equina (LANÇANOVA et al., 1988), apresentando colmos robustos, eretos e ramificados, com até 1,0 metro de altura e com capacidade de emitir raízes nos nós inferiores ou ainda colmos prostrados, com fruto do tipo cariopse (MOREIRA & BRAGANÇA, 2011).

A maioria das espécies do estrato herbáceo da Caatinga no período chuvoso é pertencente à família Poaceae, sendo formada também por espécies anuais e perenes, como capim Milhã e Capim de Raiz, respectivamente (ROMARIZ, 1968). Em estudo sobre biomassa nos primeiros 60 e 90 dias após as primeiras chuvas na Caatinga, Silva et al. (2011) observaram que o capim Milhã foi o componente principal da pastagem, com percentuais de 46,75 e 52,09% da composição total. Embora não existam estudos com desempenho dessa gramínea com equinos, é uma gramínea palatável e, por isso, bastante consumida por animais criados no Semiárido.

Estudos compararam a produção de matéria seca do capim Milhã com e sem adubação nitrogenada, e obtiveram valores médios de produção de 4.657, 5.619 e 8.753 Mg de MS.ha⁻¹, para os níveis de 0, 100 e 200 Kg de N.ha⁻¹, respectivamente. Os autores também relataram valores médios de digestibilidade *in vitro* de 45,44% em bovinos, entre os tratamentos (MARTINS et al. 2000).

3.3.4 Capim de Raiz (*Chloris orthonoton*, Doell)

O Capim de Raiz é uma gramínea endêmica do Semiárido nordestino, com maior ocorrência nas regiões agreste e sertão de Pernambuco. Essa gramínea geralmente cresce em

associação com outras espécies, sendo muitas vezes o componente principal da pastagem. É uma planta perene, estolonífera, com folhas de bainha comprida, inflorescência fasciculada, digitada, formada por espigas terminais numerosas, apresentando bom quantitativo de florescência e frutificação (CRUZ, 1983).

Segundo Cruz (1983), a espécie é capaz de produzir boa quantidade de forragem de qualidade, sendo tolerante à seca e a solos salinos, neste contexto, Fernandes et al. (1983), trabalhando com Capim de Raiz (*Chloris orthonoton*, Doell) diferido por um período de 90 dias, obtiveram teores de matéria seca em torno de 51,30%, com produção de matéria seca de aproximadamente 1.357 Mg.ha⁻¹. Essa gramínea é bastante consumida pelos animais no início da seca (LEITE et al., 2009).

Quando se trata de gramíneas nativas, muito se questiona sobre desempenho produtivo e ou valores nutricionais, buscando uma resposta a estes questionamentos, Oliveira et al. (2004) analisaram o efeito da adubação fosfatada e regimes de corte na composição química e digestibilidade *in vitro* do Capim de Raiz. Estes autores observaram que tanto a adição de fósforo, como a altura de corte influenciaram a digestibilidade do Capim de Raiz na espécie bovina.

Silva et al. (2013) avaliaram a qualidade do feno de Capim de Raiz para pequenos ruminantes e encontraram valores bromatológicos de 90,66% de MS; 7,16% de PB e 65,34% de FDN, com coeficientes de digestibilidade da MS, PB e FDN, de 52,8; 70,6 e 40,4%, respectivamente. Os autores concluíram que o feno de Capim de Raiz não é recomendado como fonte de alimento exclusivo para pequenos ruminantes, por apresentar baixo valor nutritivo, corroborando com os resultados encontrados por Morais et al. (2009), avaliando a composição química e consumo de nutrientes do feno de capim de Raiz em ovinos.

Embora demonstre baixo teor de proteína, de acordo com os autores supracitados, esta espécie pode representar excelente fonte de matéria seca para equinos, principalmente, por se tratar de animais que tem a energia como nutriente limitante (NRC, 2007).

3.3.5 Capim Corrente (*Urochloa mosambicensis*)

O capim Corrente é uma gramínea originária do Sul da África, que foi introduzida em Pernambuco, através do Instituto de Pesquisa Agrônômica (IPA), na cidade de Serra Talhada (SILVA et al., 1986). Trata-se de uma gramínea perene e adaptada ao clima tropical, com boa tolerância à seca. O capim Corrente apresenta crescimento variado, podendo apresentar estolões a pequenos rizomas. Seus caules são lisos, podendo alcançar 100 cm de

comprimento, com folhas de 15 cm de comprimento por 1,5 cm de largura, com pelos em ambas as faces, apresentando de 4 a 12 espiguetas (OLIVEIRA, 1999).

De modo geral é uma planta que pode ser cultivada em vários tipos de solos, mas preferencialmente em solos ligeiramente argilosos, exigindo precipitação anual média de 500 a 1000 mm. Seu plantio pode ser realizado através de sementes ou mudas, plantadas em sulcos, covas ou até mesmo a lanço (OLIVEIRA, 1999).

Ao avaliarem as características produtivas do capim Corrente adubado com esterco suíno, Sá Junior et al. (2018) observaram que a adubação com 15 t.ha⁻¹ de esterco suíno proporcionou acúmulo de 3.120,5 kg.ha⁻¹ de matéria seca do capim na altura de corte de 10 cm, indicando incremento na matéria seca acumulada de 94,36% em relação ao tratamento sem adubação orgânica.

3.4 Métodos de estimativa de digestibilidade

O consumo e a digestibilidade dos alimentos são considerados fatores diretamente ligados à produção animal. Segundo van Soest (1994), a digestibilidade verdadeira dos alimentos é expressa como a porcentagem do nutriente que desaparece no caminho entre a ingestão e a excreção destes nas fezes, subtraindo dos mesmos os produtos metabólicos como bactérias e resíduos endógenos advindos do animal.

A estimativa da digestibilidade dos nutrientes dos alimentos utilizados em dieta para equinos pode ser determinada através de alguns métodos. Contudo, fatores como o bem-estar animal e poucos estudos sobre a eficiência das técnicas existentes, impactam na decisão sobre qual método utilizar.

A técnica de coleta total de fezes é a mais tradicional, exata e confiável para estimar a produção fecal e o coeficiente de digestibilidade dos nutrientes de dietas para equinos (MAURÍCIO et al., 1996; SILVA et al., 2009). Todavia, este método requer controle severo da ingestão e excreção dos alimentos, e apresenta como dificuldades, o manejo com a grande quantidade de fezes produzida pelos animais, além da necessidade de instalações adequadas, onerando os custos.

Dentre os métodos que podem ser utilizados em substituição à coleta total de fezes, existem os métodos indiretos, que utilizam indicadores internos ou externos, os quais são bastante utilizados por apresentarem baixo custo de execução e fácil análise. Os indicadores internos são aqueles inerentes ao próprio alimento, ou seja, a parte totalmente indigestível, Alvarenga et al. (1996) avaliaram a fibra em detergente neutro indigestível, fibra em

detergente ácido indigestível, celulose indigestível (Celi) e lignina indigestível (Ligi), como indicadores internos, os autores observaram que a fibra em detergente ácido indigestível foi o indicador que melhor estimou o fluxo da digesta ileal em equinos consumindo dietas com 70% de feno de capim *Coast Cross* e 30% de concentrado, em comparação a dietas exclusivas de volumoso.

Araújo et al. (2000a) compararam o método de coleta total de fezes em equinos com o uso de dois indicadores internos: cinza insolúvel em detergente ácido (CIDA) e cinza insolúvel em HCl (CIA), estes autores não encontraram diferença no coeficiente de digestibilidade da matéria seca, obtendo valores de 43,01; 42,74 e 43,05%, respectivamente.

Os indicadores externos compreendem aqueles não inerentes às plantas, sendo usado mais frequentemente o óxido crômico. Este método indireto baseia-se na recuperação total do indicador ingerido nas fezes. Soares et al. (2003) compararam o método de coleta total com o método indireto usando óxido crômico e obtiveram valores médios de digestibilidade em bovinos de 62,3 e 71,7%, respectivamente, demonstrando que o indicador subestimou o método da coleta total de fezes em 13,1%.

Na espécie equina, Oliveira et al. (2003) compararam o método de coleta total de fezes com os métodos que utilizam oxido crômico e indicadores internos, para estimar a digestibilidade dos nutrientes. Os autores relataram que o óxido crômico subestimou a digestibilidade, em relação ao método de coleta total de fezes.

Outro indicador bastante utilizado e preciso é a lignina purificada do eucalipto LIPE[®]. As estimativas de produção fecal e digestibilidade confirmaram a eficiência do LIPE[®] como indicador externo, por não apresentar diferença em relação à coleta total de fezes (PEREIRA, 2003). Lanzetta et al. (2009) trabalhando com potras alimentadas com feno de alfafa e concentrado comercial na proporção de 50:50, determinaram a digestibilidade dos nutrientes através do óxido crômico, LIPE[®] e coleta total de fezes. Os autores observaram que as taxas médias de recuperação fecal, e digestibilidade dos nutrientes utilizando o LIPE[®] foram semelhantes aos valores obtidos com a coleta total de fezes, concluindo que o LIPE[®] pode ser utilizado em substituição à coleta total.

Apesar de mostrarem-se adequados para à estimativa da digestibilidade dos alimentos, alguns cuidados devem ser tomados na sua utilização, pois alterações na excreção dos indicadores ou na análise dos mesmos nas fezes ou dietas podem comprometer os resultados dos ensaios de digestão.

3.4.1 Técnica dos sacos móveis em equinos

Com o avanço nos estudos dos processos digestivos dos animais, os métodos para estimar a digestibilidade dos alimentos foram modificados e atualizados, com a finalidade de obter técnicas mais precisas (ØRSKOV et al., 1980).

Embora as técnicas laboratoriais de determinação *in vitro* estejam bem desenvolvidas e sejam utilizadas com precisão em ruminantes, na espécie equina essa realidade é diferente, em razão das peculiaridades digestivas dos cavalos, com digestão química e enzimática antes da fermentação microbiana no ceco e cólon. Além disso, existem poucos estudos sobre quanto do alimento ingerido pelos equinos é digerido antes da fermentação no intestino grosso. Nesse sentido, é de suma importância o desenvolvimento de novas técnicas que busquem simular mais fielmente o que ocorre no trato digestivo dos equinos.

A técnica dos sacos móveis consiste na introdução, no trato digestório, de pequenas quantidades de alimento em sacos de tecido sintético indigestível, previamente pesados, com porosidade e área conhecida, com a finalidade de permitir a ação microbiana e enzimática. Segundo Vanzant et al. (1998), a relação quantidade de amostra mg/área (cm²) ideal para que haja perfeita ação microbiana e enzimática na amostra, é de 10 a 20 mg/cm².

De forma geral, esses sacos são inseridos no trato digestivo, através de fístula ou sonda nasogástrica, sendo os mesmos posteriormente recuperados nas fezes (HYSLOP, 2006). A técnica permite avaliar a digestibilidade dos alimentos *in vivo*, possuindo as vantagens de analisar vários alimentos simultaneamente, além do baixo custo. Entretanto, além de exigir mais tempo na confecção dos sacos, pode causar maior incômodo aos animais, pela necessidade de utilizar fístulas ou sonda nasogástrica para introduzir os mesmos (ARAÚJO et al., 2000b; SILVA et al., 2009). Portanto, metodologias mais práticas e menos invasivas podem ser uma alternativa importante para estimativa de parâmetros nutricionais dos alimentos na espécie equina, desde que demonstrem resultados aceitáveis.

Sauer et al. (1983) foram os primeiros a utilizar esta técnica, submetendo, inicialmente os sacos contendo farelo de soja e farinha de carne e ossos a uma pré digestão *in vitro* com HCl e pepsina. Em seguida, os sacos foram introduzidos no duodeno de suínos fistulados e recuperados nas fezes após 48 horas. Como resultado, os autores encontraram valores para coeficiente de digestibilidade aparente da proteína bruta do farelo de soja em torno de 88,1 %, condizentes com os resultados da literatura.

Visando aperfeiçoar a técnica, Cherian et al. (1989), trabalhando com suínos, testaram a influência da granulometria de moagem, quantidade de amostra e tamanho do

saquinho na digestibilidade aparente da proteína, eles observaram menor ação digestiva nas amostras moídas a 2 mm e nos saquinhos com poros de 10 μ . Já o tamanho do saquinho não influenciou a digestibilidade da proteína, os autores também relataram que a menor quantidade de amostra, 0,5 g, ao contrário de 1,0 g, aumentou a taxa de digestibilidade dos alimentos analisados.

Os pioneiros nos testes com a técnica de sacos móveis em equinos foram Macheboeuf et al. (1995), buscando validar os resultados da técnica. Os autores mensuraram a digestão do nitrogênio de sete tipos de fenos de diferentes qualidades em equinos fistulados no ceco, e compararam com o método convencional de coleta total de fezes. Os autores concluíram que a técnica de sacos móveis pode ser utilizada satisfatoriamente para mensurar a digestibilidade do nitrogênio de fenos.

A partir daí, outras pesquisas foram realizadas com o intuito de investigar a confiabilidade da técnica. Araújo et al. (2000b) compararam a técnica dos sacos móveis com o método de coleta total de fezes, testando três diferentes granulometrias (1, 2 e 3 mm) de amostras de feno de *Coast Cross* e capim elefante. Os autores não observaram diferença na digestibilidade do feno de *Coast Cross* em ambas as técnicas, quando as amostras foram moídas a 1 mm. Este resultado está em concordância com o observado por Gollcher et al. (2010), que avaliaram três diferentes granulometrias de amostra de silagem de grãos úmidos de sorgo com baixo e alto tanino em equinos. Contudo, Araújo et al. (2000b) observaram diferença entre as técnicas na digestibilidade da fibra em detergente neutro, tendo a técnica de sacos móveis subestimado os valores, em relação aos obtidos na coleta total de fezes.

Rodrigues et al. (2012) avaliaram a digestibilidade dos nutrientes do feno de *Coast Cross* através dos métodos de sacos móveis e coleta total de fezes. Os autores não encontraram diferença entre os coeficientes de digestibilidade estimados pelas duas técnicas, concluindo que a técnica dos sacos móveis pode ser utilizada para prever a digestibilidade aparente dos nutrientes em equinos.

Ao avaliarem a degradação dos nutrientes de quatro alimentos fibrosos através da técnica de sacos móveis em pôneis, coletando os sacos na junção ileocecal e nas fezes, Moore Colyer et al. (2002) encontraram diferenças ($P < 0,05$) em todos os constituintes estudados. De Fombelle et al. (2004) testaram os efeitos da composição da dieta e padrão alimentar na digestibilidade pré cecal do amido de diferentes fontes, através do método de sacos móveis em equinos. Os autores constataram que, independentemente do substrato, houveram maiores coeficientes de digestibilidade do amido quando os animais foram alimentados com

dieta rica em amido, demonstrando que a dieta influencia diretamente a microbiota cecal, neste caso, beneficiando as bactérias amilolíticas.

Silva e colaboradores (2009) estudaram a digestibilidade de sete alimentos volumosos através da técnica dos sacos móveis, e relataram dados satisfatórios para estimativa da digestibilidade em equinos, todavia, observaram elevados coeficientes de digestibilidade para alguns nutrientes, possivelmente, associados às perdas de partículas durante a passagem dos sacos no trato digestivo.

Rosenfeld & Austbø (2009) mediram o desaparecimento do amido e da proteína de grãos de aveia, cevada e milho a nível pré cecal e total, cada cereal foi testado em quatro formas diferentes: moído, peletizado, extrusado e micronizado, em quatro cavalos fistulados no ceco. A aveia apresentou alto grau de digestibilidade do amido 94,9% (pré cecal) e 99,0% (total), sendo superior ($P<0,05$) ao da cevada 70,5 e 96,0% e do milho 66,3 e 91,0%, respectivamente, contudo apresentou maior digestibilidade pré-cecal da proteína ($P<0,05$), mas menor digestibilidade total que os demais grãos ($P<0,05$) com valores de 68,1% e 75,3%, respectivamente. Os cereais tratados em alta temperatura (extrusados e micronizados) apresentaram maior digestibilidade total da proteína, que os cereais não tratados ($P<0,05$).

Além de predizer a digestibilidade aparente dos alimentos, a técnica dos sacos móveis pode ser usada para estimar compostos indigestíveis das forragens. Oliveira et al. (2012a) utilizaram a técnica de sacos móveis em equinos para obter marcadores internos Celulose indigestível e Lignina indigestível do feno de *Coast Cross* e grãos de milho, e concluíram que esses marcadores podem ser obtidos de forma satisfatória através da técnica dos sacos móveis em equinos.

3.4.2 Técnica de digestibilidade *in vitro*

Como visto anteriormente, os métodos *in vivo* são considerados os mais confiáveis, pois são realizados nos próprios animais, entretanto, esses métodos possuem algumas desvantagens, como o uso de grande quantidade de amostra, o uso ético de animais em experimentação e o elevado custo de execução. Estes são fatores justificam à busca por métodos que possam predizer de forma segura, com menor custo e curto prazo os valores de digestibilidade dos alimentos (BERCHIELLI et al., 2006).

Na busca por alternativas, os métodos *in vitro* surgem como uma boa opção, uma vez que visam representar os processos de digestão que ocorrem no trato digestório dos animais,

com maior acurácia possível, em condições laboratoriais. Contudo, a simulação das condições mais próximas às que acontecem no animal nem sempre são eficientes, e muitas vezes questionadas. Neste sentido, diversos estudos vêm sendo realizados e as metodologias constantemente aperfeiçoadas, visando maior precisão com relação aos resultados *in vivo* (VAN SOEST, 1994; BERCHIELLI et al., 2006).

Na espécie equina, a digestão dos alimentos ocorre em duas etapas; primeiramente, uma digestão ácida e enzimática, seguida de fermentação microbiana (REECE, 2017). Nos seres vivos os processos de digestão ácida e enzimática têm a função de viabilizar a quebra e absorção dos nutrientes. Os ensaios *in vitro* buscam mimetizar esses processos, entretanto, muitos fatores estão ligados a este mecanismo, dificultando o ajuste da técnica.

Em relação a digestão fermentativa *in vitro*, o menor conteúdo de microrganismos quando se utiliza inóculo fecal equino tem, de certa forma, diminuído a eficiência da técnica e, conseqüentemente, a confiabilidade dos dados. Além disso, o rápido acúmulo de produtos da fermentação leva à redução do pH, podendo afetar a digestibilidade de alguns nutrientes ao causar a morte dos microrganismos (STERN et al., 1997).

Em ruminantes, a metodologia desenvolvida por Tilley & Terry (1963) ainda é a mais utilizada, essa técnica exige a coleta de líquido ruminal que, posteriormente, é usado como inóculo para incubação das amostras. O método consiste em submeter as amostras à ação do inóculo por um tempo determinado, afim de reproduzir o que ocorre dentro do trato, tentando replicar condições de temperatura, pH, microbiota, entre outros (SILVA & QUEIROZ, 2002). Esta técnica tem sido adaptada para a espécie equina, porém com algumas ressalvas, já que nos equinos ocorre pré digestão química e enzimática e certo grau de fermentação a nível estomacal (DE FOMBELLE et al., 2003; VARLOUD et al., 2007).

Macheboeuf et al. (1998) foram uns dos primeiros pesquisadores a utilizarem fezes equinas como fonte de inóculo. Eles testaram o inóculo para predizer a digestibilidade da matéria orgânica de forragens a partir de parâmetros de produção de gás, e concluíram que as fezes podem ser usadas como fonte de inóculo no teste de produção de gás, para predizer a digestibilidade da matéria orgânica em cavalos. Embora tenham salientado que deve ser verificada com grande número de forragens, além de ser menos preciso do que quando se usa inóculos com fluido cecal (COSTA & WEESE., 2012).

Tendo em vista que os processos digestivos dos equinos são diferentes dos ruminantes, alguns pesquisadores tentaram adaptar a metodologia preconizada por Tilley & Terry (1963). Neste intuito, Abdouli & Ben Attia (2007) desenvolveram um método *in vitro* com inóculo fecal, utilizando um dos estágios da metodologia preconizada por Tilley &

Terry (1963), na qual as amostras sofrem digestão química e enzimática antes de serem incubadas com o inóculo. O método consiste na utilização de soluções com pepsina e pancreatina, por tempo determinado, com minucioso controle do pH, para simular o que ocorre no estômago e duodeno do equino. Logo após, adiciona-se inóculo oriundo das fezes equinas, para simular a fermentação da parte final do trato digestivo, permanecendo por 48 horas em temperatura semelhante à do animal. Estes autores testaram três diferentes tempos de ação enzimática, em três tipos de alimentos, com dois métodos de filtragem e constataram que todos os alimentos sofreram efeito da pré digestão. Embora tenha sido inovadora, muito se questiona sobre essa metodologia por não considerar a fermentação que ocorre em outros segmentos do trato digestivo do equino.

A validação dos dados obtidos nos ensaios *in vitro* é uma preocupação de vários pesquisadores. Nesse sentido, Murray et al. (2014) trabalhando com equinos, compararam inóculo fecal com inóculos de fluido cecal e dos cólons ventral e dorsal. Os autores obtiveram resultados semelhantes para produção de gás entre os inóculos fecal e cecal, em todos os substratos. Valores mais baixos foram obtidos nas amostras incubadas com fluido colônico, assim, concluíram que as fezes são uma alternativa adequada para substituir o fluido cecal de equinos.

Embora o autor supracitado tenha chegado à conclusão sobre a eficiência do uso do inóculo fecal em substituição ao fluido cecal, sabe-se que a qualidade da microbiota presente no ceco e no cólon dos equinos é fundamental para uma boa fermentação. Na tentativa de buscar alternativas para melhorar a eficiência digestiva dos equinos, a partir da digestão microbiana, Elghandour et al. (2014) avaliaram a capacidade fermentativa do inóculo fecal na presença de diferentes doses de *Saccharomyces cerevisiae* em nove tipos de alimentos fibrosos. Os autores relataram que a adição de diferentes doses de levedura não surtiu efeito ($P > 0,05$) em nenhum dos parâmetros analisados. Contudo, numericamente melhorou a capacidade de fermentação fecal de forrageiras de baixa qualidade.

A busca por volumosos de melhor qualidade para alimentação de equinos instigou novas pesquisas sobre alimentos com melhor digestibilidade da fibra. Os testes *in vitro* são amplamente utilizados nesta estimativa, já que são capazes de mimetizar os processos fermentativos do segmento final do trato digestivo dos equinos. Kholif et al. (2016) estudaram o inóculo fecal de cavalos alimentados com dietas de alta-fibra com adição ou não de enzimas fibrolíticas e adição ou não das enzimas antes da incubação *in vitro* e seus efeitos na produção de gás. Os resultados mostraram que houve interação ($P < 0,05$) entre a fonte fecal e adição enzimática para a produção de gás (PG) assintótica, taxa de PG, e PG às

2, 4, 6, 8 e 10 horas após a incubação. Com finalidade semelhante, Wagner et al. (2017) testaram o uso de um aditivo (*DigestaWell Fiber*) na digestibilidade *in vitro* de diferentes tipos de fenos, usando fezes equinas como fonte do inóculo. A digestibilidade da matéria seca diferiu entre as forragens ($P < 0,05$) em todas as incubações, em ambos os tempos de incubação (24 e 48 horas), a digestibilidade da matéria seca foi inversamente relacionada à concentração de fibra em detergente neutro ($R^2 = 0,99$) e fibra em detergente ácido ($R^2 = 0,68$ às 24 horas, $R^2 = 0,70$ às 48 horas).

Os métodos *in vitro* são utilizados também para estimar componentes indigestíveis das plantas, Oliveira et al. (2012b) utilizaram fezes equinas como fonte de inóculo para obter dois marcadores internos do feno de *Coast Cross*, e compararam com o método de coleta total de fezes e com a técnica utilizando inóculo de líquido ruminal. Os autores relataram coeficiente de digestibilidade aparente semelhantes para os nutrientes do feno de *Coast Cross* estimados a partir dos indicadores obtidos com o inóculo de fezes equinas, quando comparado aos obtidos a partir da técnica de coleta total de fezes.

Ao avaliarem a influência da hidratação do substrato de feno de *Coast Cross* e da diluição do inóculo fecal equino nos parâmetros de fermentação e microbiologia em ensaios *in vitro*, Franzan e colaboradores (2018), observaram que a hidratação 12 horas antes da incubação e o tempo de incubação influenciaram ($P < 0,05$) a taxa de degradação dos nutrientes do alimento, porém, não observaram efeito da diluição do inóculo fecal com solução nutritiva na proporção 1:1 ou 1:3. Além disso, não houve efeito de nenhum dos tratamentos avaliados sobre a taxa de fermentação (FRANZAN et al., 2018).

Duvnjak et al. (2018) avaliaram o efeito de níveis de ingestão de amido de 0,3, 0,6 e 0,9 g/kg de peso vivo, na digestibilidade fecal *in vitro* da fibra em detergente neutro (DIVFDN) e matéria seca (DIVMS), e na população das bactérias amilolíticas, celulolíticas e lactobacilos fecais. Os autores concluíram que o nível diário de amido na dieta para equinos, de até 0,9 g/kg de peso vivo, tem efeito positivo sobre a digestibilidade da fibra e microbiota das fezes.

4 REFERÊNCIAS

ABDOULI, H.; BEN ATTIA, S. Evaluation of a two-stage *in vitro* technique for estimating digestibility of equine feeds using horse faeces as the source of microbial inoculum. **Animal Feed Science and Technology**, v. 132, n. 1–2, p. 155–162, 2007.

ALENCAR, C. A. B. et al. Valor nutritivo de gramíneas forrageiras tropicais irrigadas em diferentes épocas do ano. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, v. 40, n. 1, p. 20–27, 2010.

ALVARENGA, R. C. **Fluxo de matéria seca ileal, metodologias de coleta de digesta e digestibilidade aparente total e parcial em equinos**. Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 59p. 1996. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal de Viçosa, 1996.

ALVES FILHO, D.C. et al. Características agronômicas produtivas, qualidade e custo de produção de forragem em pastagem de azevém (*Lolium multiflorum*, L.). **Ciência Rural**, v.33, n.1, p.143-149, 2003.

ANDRADE, A. P. et al. Produção animal no semiárido: o desafio de disponibilizar forragem, em quantidade e com qualidade, na estação seca. **Tecnol. & Ciên. Agropec.**, João Pessoa, v. 4, n. 4, p. 01-14, 2010.

ARAÚJO FILHO, J. A. et al. Composição botânica e química da dieta de ovinos e caprinos em pastoreio combinado na região dos Inhamuns, Ceará. **Revista sociedade brasileira de zootecnia**, v. 25, p. 13, 1996.

ARAÚJO FILHO, J. A. et al. Efeitos da manipulação da vegetação lenhosa sobre a produção e compartimentalização da fitomassa pastável de uma caatinga sucessional. **Revista Brasileira de Zootecnia**, Viçosa, v. 31, n. 1, p. 11-19, 2002.

ARAÚJO FILHO, J. A. **Manejo pastoril sustentável da caatinga**. Recife, Projeto Dom Helder Câmara, 2013. 200 p.

ARAÚJO, K.V. et al. Comparação entre os indicadores internos e o método de coleta total na determinação da digestibilidade dos nutrientes de alimentos volumosos, em equinos. **Revista Brasileira de Zootecnia**, n. 29, p. 745-751, 2000a.

ARAÚJO, K. V. et al. Comparação da Técnica do Saco de Náilon Móvel com o Método de Coleta Total para Determinar a Digestibilidade dos Nutrientes de Alimentos Volumosos em Equinos. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 29, n. 4, p. 752–761, 2000b.

ARAÚJO, S. M. S. A REGIÃO SEMIÁRIDA DO NORDESTE DO BRASIL: Questões ambientais e possibilidades de uso sustentável dos recursos. **Revista Científica da FASETE**. n 5. 2011.

ATHAYDE, A. A. R. et al. **Gramíneas do gênero Cynodon** – Cultivares recentes no Brasil. Boletim Técnico. UFLA. n.º 73 - p. 1-14 Lavras, MG. 2005.

BANDEIRA, L.A.M. **O feudo: a Casa da Torre de Garcia d'Ávila: da conquista dos sertões à independência do Brasil**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 601p.

BERCHIELLI, T.T.; RODRIGUEZ, N.M.; OSÓRIO NETO, E. et al. **Nutrição de ruminantes**. Jaboticabal: Funep, 2006. 583p.

BOTREL, M. A.; NOVAES, L. P.; ALVIM, M. J. **Características forrageiras de algumas gramíneas tropicais**. Juiz de fora, MG: EMBRAPA-CNPGL, 1998, 35p.

BRASIL - **Estudo do Complexo do Agronegócio Caval**. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Brasília: CNA, 68p. 2004.

BRASIL - FLORA DO BRASIL 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: < <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/> >. Acesso em: 20 Jun. 2019.

BRASIL - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. **Delimitação do semiárido**, 2017. Disponível em <<http://www.mi.gov.br/web>>. Acesso em 10/05/2019.

BRASIL - MINISTÉRIO DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Revisão do estudo do complexo do agronegócio do cavalo**. Brasília: MAPA, 56p. 2016.

CASTAGNARA, D. D. et al. Valor Nutricional e Características Estruturais de Gramíneas Tropicais sob Adubação Nitrogenada. **Archivos de Zootecnia**, v. 60, n. 232, p. 931–942, 2011.

CHERIAN, G.; SAUER, W. C.; THACKER, P. A. Factors affecting the apparent digestibility of protein for swine when determined by the mobile nylon bag technique. **Animal Feed Science and Technology**, v. 27, n. 1–2, p. 137–146, 1989.

COSTA, M. C.; WEESE, J. S. The equine intestinal microbiome. **Animal health research reviews**, v. 13, n. 1, p. 121–128, 2012.

CRUZ, M. S. D. **Germinação e crescimento do capim-de-raiz (Chloris orthonoton Doell)**. Recife: Universidade Federal Rural de Pernambuco, 1983. 59 p. Dissertação (Mestrado em Botânica) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, 1983.

DE FOMBELLE, A. et al. Characterization of the microbial and biochemical profile of the different segments of the digestive tract in horses given two distinct diets. **Animal Science**. 77: 293–304. 2003.

DE FOMBELLE, A. et al. Effect of diet composition and feeding pattern on the prececal digestibility of starches from diverse botanical origins measured with the mobile nylon bag technique in horses. **J. Anim. Sci**, v. 82, p. 3625–3634, 2004.

DIAS-FILHO, M. B. **Diagnóstico das pastagens no Brasil**. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2014. 36 p.

DITTRICH, J. R. et al. Comportamento ingestivo de equinos e a relação com o aproveitamento das forragens e bem-estar dos animais. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 39, p. 130–137, 2010.

DUVNJAK, M. et al. Starch in horse diet improves feces microbiota, *in vitro* digestibility of fiber and dry matter. **Journal of Central European Agriculture**, v. 19, n. 4, p. 918–930, 2018.

ELGHANDOUR, M. M. Y. et al. *In vitro* fermentative capacity of equine fecal inocula of 9 fibrous forages in the presence of different doses of *Saccharomyces cerevisiae*. **Journal of Equine Veterinary Science**, v. 34, n. 5, p. 619–625, 2014.

FAO - FAOSTAT. **Live Animals**. 2017. Disponível em: <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA>. Acesso em: 29 jun 2019.

FERNANDES, A.P.M. et al. Efeito de diferentes períodos de deferimento sobre o pasto de capim de raiz (*Chloris orthonotum*, Doell). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FORRAGEIRAS E PASTAGENS NATIVAS, Olinda, 1983. **Anais...** Olinda: Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária - IPA e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, 1983.

FILGUEIRAS, T. S.; SANTOS GONÇALVES, A. P. A Checklist of the basal grasses and bamboos in Brazil (Poaceae). **The Journal of the American Bamboo Society**, v.18 p.7-18, 2004.

FIORELI, A. B. et al. Valor nutritivo de gramíneas do gênero *Cynodon* consorciadas com amendoim forrageiro. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 70, n. 6, p. 1970–1978, 2018.

FONSECA, D. M.; SANTOS, M. E. R.; MARTUSCELLO, J. A. **Plantas Forrageiras**. 1ª ed. Viçosa-MG: UFV, 2010.

FONTANELI, R. S.; SANTOS, H. P. DOS; FONTANELI, R. S. **Forrageiras para Integração Lavoura-Pecuária-Floresta na Região Sul-brasileira**. 2ª ed. Brasília, DF: EMBRAPA, 2012. 544p.

FRANZAN, B. C. et al. Equine fecal inoculum optimization in *in vitro* fermentation assays of dehydrated roughage. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 47, p. 8, 2018.

GIBSON, D.J. 2009. **Grasses and grassland ecology**. New York: Oxford Univ. Press. pp. 305.

GIULIETTI, A. M. et al. **Diagnóstico da vegetação nativa do Bioma Caatinga**. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente: Universidade Federal de Pernambuco, 2003. p. 48-78.

GOLLCHER, A. M. R. et al. Comparison between two methods for estimating the digestibility of starch and other nutrients in high moisture sorghum grain silage in horses. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 39, n. 6, p. 1252–1258, 2010.

GOULART, J.A. **O cavalo na formação do Brasil**. São Paulo: Letras e Artes, 1964. p. 249.

HILL, G. M.; GATES, R. N.; BURTON, G. W. Forage quality and grazing steer performance from Tifton 85 and Tifton 78 bermudagrass pastures. **Journal of Animal Science**, v. 71, p.3219-3225, 1993.

HYSLOP, J. J. In situ and mobile bag methodology to measure the degradation profile of processed feeds in different segments of the equine digestive tract. **Livestock Production Science**, v.100, p.18-32, 2006.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, **Produção da pecuária municipal 2017**. Brasil, 2017.

KHOLIF, A. E. et al. *In vitro* Assessment of Fecal Inocula From Horses Fed on High-Fiber Diets With Fibrolytic Enzymes Addition on Gas, Methane, and Carbon Dioxide Productions as Indicators of Hindgut Activity. **Journal of Equine Veterinary Science**, v. 39, p. 44–50, 2016.

LANÇANOVA, J.A.C.; RESTLÉ, J.; SANTOS, G.L. Digestibilidade e produção de matéria seca digestível do capim papuã (*Brachiaria plantaginea* (Link) Hitch) sob efeito de frequências de corte e nitrogênio. **Ciência Rural**, v. 18, n. 3-4, p. 319-327, 1988.

LANZETTA, V.A.S. et al. Validação do Lipe® como método para determinar a digestibilidade dos nutrientes em equinos. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v.38, n.1, p.69-74, 2009.

LEITE, P. M. B. A. et al. Caracterização anatômica de capim de raiz (*Chloris orthonoton*, doell). In: IX JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – JEPEX 2009, Recife, **Anais...** Recife: UFRPE, p. 4.

LIMA, R.A.S.; SHIROTA, R.; BARROS, G.S.C. (Ed). Estudo do complexo do agronegócio cavalo. Piracicaba: CEPEA/ESALQ/USP, 2006. 251p.

LIMA JÚNIOR, D. M. et al. Fatores Anti-Nutricionais Para Ruminantes. **Acta Veterinaria Brasilica**, v. 3, n. 4, p. 132–143, 2010.

MACHEBOEUF, D. et al. Study of nitrogen digestion from different hays by the mobile nylon bag technique in horses. *Annales de zootechnie*, v. 44, n. Suppl. 1, p. 219–219, 1995.

MACHBOEUF, D., JESTIN, M., MARTIN-ROSSET, W. Utilization of the gas test method using horse faeces as a source of inoculum. **British Society of Animal Science**, n. 22, p. 187–189, 1998.

MARTINS, J. D.; RESTLE, J.; BARRETO, I. L. Produção animal em capim papuã (*Brachiaria plantaginea* (Link) Hitch) submetido a níveis de nitrogênio. **Ciência Rural**, v. 30, n. 5, p. 887–892, 2000.

MAURICIO, R.M. et al. Determinação da digestibilidade aparente em equídeos através do óxido crômico, da lignina e da coleta total das fezes. **Arquivo Brasileiro Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 48, n. 6, p. 703-711, 1996.

MEYER, H. **Alimentação de cavalos**. 2ª Edição. São Paulo: Varela, 1995. 303p.

MOORE-COLYER, M. J. S. et al. The mobile bag technique as a method for determining the degradation of four botanically diverse fibrous feedstuffs in the small intestine and total digestive tract of ponies. **British Journal of Nutrition**, v. 88, n. 6, p. 729–740, 2002.

MORAIS, N. A. P. et al. Composição química e Consumo de nutrientes do feno de capim de raiz (*Chloris orthonoton* Doell) em ovinos. In: IV JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – JEPEX 2009, Recife, **Anais...** Recife: UFRPE, p. 3.

MOREIRA, H. J. C.; BRAGANÇA, H. B. N. **Manual de identificação de plantas infestantes: hortifrúti**. São Paulo: FMC Agricultural Products, 2011. 1017p.

MOSS, P. C. B. **Digestibilidade aparente em equinos através de métodos diretos e indiretos**. 2012. 58 p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Veterinária – UFMG.

MURRAY, J. M. D. et al. Comparison of intestinal contents from different regions of the equine gastrointestinal tract as inocula for use in an *in vitro* gas production technique. **Animal Feed Science and Technology**, v. 187, p. 98–103, 2014.

MURTHY, M. S.; RAVINDRA, R. Allelopathic effects of *Aristida adscensionis*. **Oecologia**, v. 18, n. 3, p. 243–249, 1975.

NRC – National Research Council. Nutrients requirements of horses. National Academy Press, Whashington, D.C., 5ed., 100p, 2007

NOY-MEIR, I. Desert ecosystems: environment and producers. **Annual Reviews of Ecology and Systematics**, Jerusalém, Israel, v.4, p.25-51, 1973.

OLIVEIRA, C. A. A. et al. Estimativa da digestibilidade aparente de nutrientes em dietas para equinos, com o uso de óxido crômico e indicadores internos. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 32, n. 6 suppl 1, p. 1681–1689, 2003.

OLIVEIRA, K. et al. Indigestible cellulose and lignin in determining feces production and apparent digestibility in horses. *Acta Scientiarum. Animal Sciences*, v. 34, n. 3, p. 267–272, 2012a.

OLIVEIRA, K. et al. Fezes equina como fonte de inóculo na obtenção de indicadores indigestíveis para estimar a digestibilidade em equinos. **Rev. Bras. Saúde Prod. Anim.**, v. 13, n. 2, p. 410–423, 2012b.

OLIVEIRA, M. C. **Capim Urochloa: produção e manejo no semiárido do Nordeste do Brasil**. Petrolina, PE: EMBRAPA-CPATSA, 1999. 20p.

OLIVEIRA, T. N. et al. Influência do Fósforo e do Regime de Corte na Composição Química e Digestibilidade *in vitro* do Capim-de-Raiz (*Chloris orthonoton* Doell). **R. Bras. Zootec.**, v. 33, n. 6, p. 2248–2255, 2004.

ØRSKOV, E. R.; HOVELL, F. D. D.; MOULD, F. The use of the nylon bag technique for the evaluation of feedsuffs. **Tropical Animal Production**, v. 5, n. 3, p. 195–213, 1980.

PEREIRA, R.A.N. **Lignina isolada do *Eucalyptus grandis* como indicador em experimentos de digestibilidade com coelhos.** 2003. 95f. Tese (Doutorado em Zootecnia) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2003.

RODRIGUES, L. M. et al. Roughage digestion evaluation in horses with total feces collection and mobile nylon bags. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 41, n. 2, p. 341–346, 2012.

ROMARIZ, D.A. **A vegetação.** In: AZEVEDO, A. (Ed.) *Brasil a terra e o homem: as bases físicas.* 2.ed. São Paulo: Nacional, 1968. p. 521-62.

ROSENFELD, I.; AUSTBØ, D. Digestion of cereals in the equine gastrointestinal tract measured by the mobile bag technique on caecally cannulated horses. **Animal Feed Science and Technology**, v. 150, n. 3–4, p. 249–258, 2009.

REECE, W. O. **Dukes fisiologia dos animais domésticos.** 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017

SÁ JÚNIOR, E. H. S. et al. Características agrônômicas de capim-corrente (*Urochloa mosambicensis*) adubado com esterco suíno e submetido a duas alturas de corte. **Ciência Agrícola**, v. 16, p. 1–9, 2018.

SANTOS, G.R.A. et al. Composição química e degradabilidade in situ da ração em ovinos em área de caatinga no sertão de Pernambuco. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 38, n. 2, p. 384-391, 2009.

SANTOS, G.R.A. et al. Determinação da composição botânica da dieta de ovinos em pastejo na caatinga. **Revista Brasileira de Zootecnia**, Viçosa, v. 37, p 1876-1883, 2008.

SAUER, W.C.; JORGENSEN, H.; BERZINS, R. A modified nylon bag technique for determining apparent digestibilities of protein in feedstuffs for pigs. **Canadian Journal of Animal Science**, v. 63, n. 1, p. 233-237, 1983.

SILVA, C. A. M. et al. Qualidade do feno de capim-de-raiz (*Chloris orthonoton*, doell) em pequenos ruminantes. **Arch. Zootec.** v.62, p.595-598, 2013.

SILVA, D.J.; QUEIROZ, A.C. **Análise de alimentos: métodos químicos e biológicos.** 3.ed. Viçosa, MG: Editora UFV, 2002. 235p

SILVA, D. D. **Características morfogênicas e estruturais, produção e 7composição bromatológica de capim-panasco (*Aristidea adsencionis* Linn.).** 2017. 19 f. Monografia (Graduação em ciências agrárias) – Universidade Estadual da Paraíba. Centro de ciências humanas e agrárias, Catolé do Rocha, 2017.

SILVA, M. G. S. DA et al. Dinâmica da associação de capim-milhã e capim-de-raiz em pasto diferido. **R. Bras. Zootec.**, v. 40, n. 11, p. 2340–2346, 2011.

SILVA, N. L. et al. Técnicas de manejo no controle do capim-panasco verdadeiro (*Aristida adscensionis* Linn.). In: XXXVII REUNIÃO ANUAL DA SBZ, 2000, Viçosa. **Anais...** Viçosa, 2000. p. 1-3.

SILVA, S. C. DA; JÚNIOR, D. DO N.; EUCLIDES, V. P. B. **Pastagens: Conceitos básicos, produção e manejo**. 1ª ed. Viçosa, MG: Editora Suprema, 2008. 115p.

SILVA, V. M. et al. Estudo de consorciação de duas leguminosas com três cultivares de capim buffel (*Cenchrus ciliaries*) e uma de Urochloa (*Urochloa mosambicensis*) 1º ano de estabelecimento. In: IPA (Recife, PE). **Relatório do Programa Bovinos**, período 1975/85. Serra Talhada, PE: IPA-UEP Serra Talhada, 1986. p108-110.

SILVA, V. P. et al. Digestibilidade dos nutrientes de alimentos volumosos determinada pela técnica dos sacos móveis em equinos. **R. Bras. Zootec.** 2009, vol. 38, n. 1, p. 82-89. ISSN 1806-9290.

SIQUEIRA FILHO, J. A. **A flora das Caatingas do Rio São Francisco: história natural e conservação**. Editora Andrea Jakobsson, Rio de Janeiro, Brasil. 552 p. 2012.

SOARES, J.P.G. et al. Comparação das técnicas do óxido crômico e da coleta total de fezes na determinação da digestibilidade em bovinos. **Ars veterinaria**, v. 19, n. 3, p. 280-287, 2003.

SOUSA, F.B. et al. Parâmetros agrônômicos de oito genótipos de Leucena. In: XXXVII REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 37., 2000. Viçosa, MG. **Anais...** Viçosa, MG: UFV, 2000.

SOUZA, C. et al. Disponibilidade e valor nutritivo da vegetação de caatinga no semiárido norte riograndense do brasil. **Holos**, vol. 3, 2013, pp. 196-204.

STERN, M. D.; BACH, A.; CALSAMIGLIA, S. Alternative techniques for measuring nutrient digestion in ruminants. **Journal Animal Science**, 75:2256, 1997.

TILLEY, J.M.A.; TERRY, R.A. A two-stage technique for the *in vitro* digestion of forage crops. **J. Br. Grassl. Soc.**, v. 18, p. 104-111, 1963.

VALADARES FILHO, S. C. 2000. Nutrição, avaliação e tabelas de alimentos para bovinos. XXXVII Reunião Anual da SBZ,37, Viçosa, 2000, **Anais...** Viçosa:2000. 250p.

VAN SOEST, P.J. **Nutritional ecology of the ruminant**. 2.ed. New York: Cornell University Press, 1994. 476p

VANZANT, E. S.; COCHRAN, R. C.; TITGEMEYER, E. C. Standardization of in situ techniques for ruminant feedstuff evaluation. **Journal of Animal Science**, v.76, p.2717-2729, 1998.

VARLOUD, M. et al. Postprandial kinetics of some biotic and abiotic characteristics of the gastric ecosystem of horses fed a pelleted concentrate meal. **Journal of Animal Science**. 85: 2508–2516. 2007.

WAGNER, A. L. et al. *In vitro* dry matter digestibility of forages incubated with DigestaWell Fiber. **Journal of Equine Veterinary Science**, v. 52, n. 2017, p. 93, 2017.

ZANINE, A.M. et al. Composição bromatológica de leguminosas do semiárido brasileiro. **Livestock Research for Rural Development**, Cali, v. 17, p. 1-9, 2005.

5 CAPÍTULO I – DIGESTIBILIDADE DE GRAMÍNEAS TROPICAIS ENCONTRADAS NO SEMIÁRIDO NORDESTINO ESTIMADA ATRAVÉS DA TÉCNICA DE SACOS MÓVEIS EM EQUINOS¹

¹Trabalho a ser submetido na *Revista Brasileira de Zootecnia*.

5.1 RESUMO

O objetivo do presente estudo foi estimar a digestibilidade dos nutrientes de gramíneas tropicais encontradas no Semiárido do Nordeste brasileiro, através da técnica de sacos móveis em equinos. Foram utilizados cinco equinos, fêmeas, de raça não definida, com peso médio de 400 Kg e idade média de 8,6 anos. Distribuídos em delineamento experimental quadrado latino 5 x 5, sendo cinco espécies de gramíneas e cinco períodos. A dieta dos equinos foi exclusiva de feno de Tifton 85 (*Cynodon* spp.). Os animais receberam o equivalente a 2,0% do peso vivo em matéria seca por dia. Os tratamentos foram compostos pelas gramíneas: feno de Tifton 85 (*Cynodon* spp.), capim Panasco (*Aristida adsencionis*, Linn), capim Milhã (*Brachiaria plantaginea* (Link) Hitchc), capim de Raiz (*Chloris orthonoton*, Doell) e capim Corrente (*Urochloa mosambicensis*). Os nutrientes avaliados foram: Matéria seca, matéria orgânica, matéria mineral, proteína bruta, fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido. O experimento teve duração de 63 dias, sendo os 28 primeiros dias destinados à adaptação dos equinos às baias e dieta. Os dados foram analisados através de análise de variância pelo programa “*Statistical Analysis System*”. Houve diferença ($P < 0,05$) entre os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes das gramíneas avaliadas pela técnica de sacos móveis. Os capins Tifton 85 (74,61%), Milhã (74,30%) e Raiz (68,88%) apresentaram maior ($P < 0,05$) coeficiente de digestibilidade para a matéria seca, em relação aos capins Panasco (48,40%) e Corrente (52,89%). Por outro lado, o capim Panasco demonstrou alta digestibilidade da proteína bruta (cerca de 93,35%), igualando-se ao capim Milhã (95,70%) e Tifton 85 (93,50%). Em relação à digestibilidade aparente da matéria mineral, apenas a do capim Panasco foi diferente ($P < 0,05$) das demais gramíneas. Em conclusão, a digestibilidade dos nutrientes de gramíneas tropicais encontradas no Semiárido nordestino, estimada através da técnica de sacos móveis em equinos, apresenta diferença entre as espécies.

Palavras-chave: Cavalos, Forragens, Valor nutricional.

5.2 INTRODUÇÃO

A Caatinga, bioma encontrado no semiárido nordestino brasileiro, possui vegetação constituída, especialmente, de espécies arbustivas, arbóreas e herbáceas, com extrato herbáceo representando aproximadamente 14,5% da vegetação (BRASIL, 2019). Contudo, a sazonalidade na distribuição das chuvas, bem como, fatores edafoclimáticos, propiciam o desenvolvimento de uma vegetação própria e altamente adaptada.

Além disso, das cerca de 812 espécies endêmicas da Caatinga (SIQUEIRA FILHO et al., 2012) apenas 37 pertencem a família *Gramineae* (GIULIETTI et al., 2003), que são comumente mais consumidas pelos equinos, desempenhando papel fundamental na alimentação desses animais.

Existem aproximadamente 5,58 milhões de equinos criados no Brasil, cerca de 23,2% encontram-se no Nordeste (IBGE, 2017), e que na grande maioria das propriedades têm como base alimentar as pastagens. De fato, as espécies nativas e adaptadas da caatinga têm importante contribuição na alimentação dos equinos do Nordeste, e consequentemente, para a equinocultura do país. Entretanto, pouco se sabe sobre a digestibilidade de algumas espécies tropicais encontradas nessa região, o que muitas vezes leva a não utilização dessas gramíneas, tendo em vista que, no Semiárido a oferta de forragem durante todo o ano é o maior limitante na nutrição animal.

Em suma, a digestibilidade de um alimento representa a fração ingerida que não é encontrada nas fezes (BERCHIELLI et al., 2006). Segundo Van Soest (1994), digestibilidade, é uma das principais ferramentas para determinar o valor nutritivo de um alimento. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi estimar a digestibilidade dos nutrientes de gramíneas tropicais encontradas no Semiárido do Nordeste brasileiro, através da técnica de sacos móveis em equinos.

5.3 MATERIAL E MÉTODOS

Todos os procedimentos foram realizados de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal Rural de Pernambuco (CEUA, protocolo nº, 23082/000408/2017-71).

5.3.1 Local

O experimento foi realizado nas instalações do Haras Raio de Sol, no município de Garanhuns - PE, latitude 8° 53' 27" Sul e longitude 36° 29' 48" Oeste.

5.3.2 Animais

Foram utilizados cinco equinos, fêmeas, de raça não definida, com peso aproximado de 400 Kg e idade aproximada de 8,6 anos. Previamente à fase experimental, os animais foram desverminados com vermífugo de amplo espectro à base de ivermectina e pirantel (Piraverme[®]) e tratados contra ectoparasitas através de pulverização. Os equinos foram alojados em baias individuais de alvenaria, com dimensão de 16 m², cama de areia e acesso a água e sal mineralizado *ad libitum*. Todos os dias os animais foram exercitados ao passo por cerca de 20 minutos em redondel com piso de areia.

Durante todo o experimento a dieta dos equinos foi exclusiva de feno de Tifton 85 (*Cynodon spp.*). Os animais receberam o equivalente a 2,0% do peso vivo em matéria seca por dia, segundo recomendação do NRC (2007) para animais adultos em manutenção, sendo a dieta fracionada em duas refeições diárias (06:00 e 17:00 horas).

5.3.3 Delineamento experimental

O delineamento experimental utilizado foi o quadrado latino 5 x 5, sendo cinco espécies de gramíneas e cinco períodos. Os tratamentos foram compostos pelas gramíneas: feno de Tifton 85 (*Cynodon spp.*), capim Panasco (*Aristida adsencionis*, Linn), capim Milhã (*Brachiaria plantaginea* (Link) Hitchc), capim de Raiz (*Chloris orthonoton*, Doell) e capim Corrente (*Urochloa mosambicensis*).

O feno de Tifton 85 foi adquirido no comércio local, as gramíneas Milhã e Raiz foram coletadas no agreste pernambucano (município de Garanhuns), o capim Panasco foi coletado no sertão pernambucano (município de Serra Talhada) e o capim Corrente foi obtido na região metropolitana de Recife. Com exceção do capim Corrente, as demais gramíneas foram coletadas no início da estação chuvosa e antes do estágio reprodutivo, pois para as espécies do semiárido brasileiro a disponibilidade de água tem maior influência que a idade de corte da forragem.

5.3.4 Processamento das amostras

Na fase pré experimental, as forrageiras foram submetidas à pré-secagem em estufa de circulação forçada (55°C), por 72 horas, e moídas em moinho tipo Willey, passando por peneiras com crivo de 2 mm de diâmetro para as incubações, e 1 mm para posterior determinação da composição bromatológica (Tabela 1). No laboratório de bromatologia foram determinados os conteúdos de matéria seca (MS), matéria orgânica

(MO), matéria mineral (MN), proteína bruta (PB) e extrato etéreo (EE) das forragens (AOAC, 1990). As análises de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) foram determinadas de acordo com metodologia preconizada por Van Soest et al. (1991), adaptada por Senger et al. (2008).

Também foram determinadas as frações de celulose (CEL) e hemicelulose (HEM) pelas equações: $CEL = FDA - LIG$ e $HEM = FDN - FDA$. Para determinação da lignina (LIG) foi realizada a solubilização da celulose com ácido sulfúrico a 72%, conforme metodologia proposta por Van Soest et al. (1991).

Os carboidratos totais (CHOT) foram estimados pela equação: $CHOT = 100 - (PB + EE + MM)$ descrita por Sniffen et al. (1992). Os carboidratos não fibrosos (CNF), que correspondem às frações "A + B1", foram estimados pela equação $CNF = CHOT - FDN_{cp}$, em que FDN_{cp} corresponde ao FDN corrigido para cinzas e proteína. A fração fibra indigerível (C) foi estimada pela equação fração C = $FDN \times 0,01 \times LIG \times 2,4$ (SNIFFEN et al., 1992). A fração fibra digerível (B2) foi obtida pela diferença entre a FDN_{cp} e a fração C.

Tabela 1 - Composição bromatológica das gramíneas.

Composição (g.Kg ⁻¹ MS)	Gramíneas				
	Panasco	Milhã	Tifton 85	Corrente	Raiz
Matéria seca	440,6	197,6	870,8	318,3	293,3
Proteína bruta	96,8	124,0	85,1	77,6	68,2
Extrato etéreo	5,4	6,3	6,0	11,6	15,2
Fibra em detergente neutro	752,1	631,0	750,9	689,6	609,2
Fibra em detergente ácido	380,7	286,9	355,8	376,9	300,1
Matéria orgânica	951,9	890,9	909,1	934,6	887,1
Matéria mineral	48,0	109,0	91,0	65,3	112,9
Hemicelulose	371,4	344,1	395,1	312,7	309,1
Celulose	305,3	242,5	298,9	324,5	263,0
Lignina	75,4	44,4	56,9	52,4	37,1
PIDN ¹ (g.Kg ⁻¹ PB)	266,8	343,4	678,6	371,8	825,8
CHOT ²	849,7	756,6	817,9	845,5	803,7
A+B1 ³ (g.Kg ⁻¹ CHOT)	148,0	268,2	189,1	226,6	336,3
B2 ⁴ (g.Kg ⁻¹ CHOT)	691,9	642,9	685,4	670,8	596,2
C ⁵ (g.Kg ⁻¹ CHOT)	160,0	88,9	125,5	102,5	67,5

¹Proteína indigestível em detergente neutro; ²Carboidratos totais; ³Carboidratos solúveis; ⁴Fibra potencialmente digestível; ⁵Fibra indigestível.

5.3.5 Preparação dos sacos móveis

Os sacos móveis foram confeccionados nas dimensões de 7,5 x 2 x 2 cm, utilizando tecido de poliéster (Oxfordgold®), com porosidade de 45µ, selados à quente (ARAÚJO et al., 1996). Posteriormente, os sacos foram identificados individualmente,

lavados com água destilada e secos em estufa de ventilação forçada a 55°C por 24 horas. Em seguida, cada saco recebeu aproximadamente 510 mg de amostra, seguindo recomendação proposta por Vanzant et al. (1998), que estabeleceram relação entre 10 e 20 mg de amostra por cm² de saco, obtendo-se assim 17 mg MS/cm² de saco. Na sequência, para obtenção do peso do saco vazio os sacos foram pesados em balança de precisão, e seu peso total foi subtraído do peso da amostra.

5.3.6 *Incubações*

A inserção dos sacos no estômago dos animais foi realizada com sonda nasogástrica semisiliconizada de 15 mm de diâmetro interno, lubrificada externamente com vaselina líquida. Os sacos percorreram toda a extensão da sonda e chegaram ao estômago dos equinos com auxílio de sopro humano. Cada equino recebeu 35 sacos em cada uma das sondagens, totalizando 140 sacos/animal/período.

5.3.7 *Duração do experimento*

O experimento teve duração de 63 dias, sendo os primeiros 28 dias destinados à adaptação dos equinos às baias e dieta, seguido por 35 dias de fase experimental propriamente dita, dividida em cinco períodos de sete dias cada. No primeiro e segundo dia de cada período foram realizadas as incubações dos sacos móveis, duas vezes ao dia, com intervalos de 12 horas entre as incubações, totalizando quatro incubações por período. Do segundo ao quinto dia foram realizadas as coletas de fezes, que se iniciavam 18 horas após a primeira incubação. Com intuito de promover descanso entre as incubações, o sexto e sétimo dia foram de intervalo, proporcionando assim melhor bem-estar aos animais.

5.3.8 *Coletas*

As coletas foram realizadas a partir do segundo dia de cada período e teve duração de quatro dias, com início 18 horas após a primeira incubação (SILVA et al., 2009). Os sacos foram coletados imediatamente após sua excreção nas fezes, registrando-se o horário de recuperação e armazenados em freezer a -18°C. Para análises bromatológicas do resíduo, foram considerados apenas os sacos recuperados 48 ± 12 horas de retenção, a fim de se aproximar do tempo médio de retenção de um alimento fibroso no trato gastrointestinal do equino (BRANDI & FURTADO, 2009).

Ao final do experimento os sacos selecionados foram lavados manualmente em água corrente, até que a água de lavagem se apresentasse límpida. Em seguida, as amostras foram mantidas em estufa de circulação forçada (55°C) por 48 horas. Após secagem, os sacos foram pesados para determinação das perdas de matéria seca, e uma amostra composta foi obtida a partir dos sacos selecionados de cada animal em cada período.

As perdas dos nutrientes foram expressas como coeficiente de digestibilidade (CD) da matéria seca, proteína bruta, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, matéria orgânica e matéria mineral, determinadas pela equação:

$$CD (\%) = ((I-F)/I) \times 100$$

Em que: I = quantidade do nutriente inserida em cada saco; e F = quantidade do nutriente após a recuperação dos sacos nas fezes (MOORE-COLYER et al., 2002).

A proteína bruta do resíduo foi corrigida para impregnações microbianas, de acordo com metodologia descrita por Mass et al. (1999), na qual a análise de nitrogênio total é realizada a partir do resíduo da análise de fibra em detergente neutro, desconsiderando a proteína microbiana presente na amostra.

5.3.9 Análises estatísticas

Inicialmente os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Somente os resultados de matéria seca precisaram sofrer transformação logarítmica. Na sequência, os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de significância de 5%, utilizando o PROC GLM do *Statistical Analysis System* (SAS, 2002).

5.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve diferença ($P < 0,05$) entre os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes das gramíneas avaliadas pela técnica de sacos móveis (Tabela 2).

Tabela 2 – Digestibilidade aparente dos nutrientes de gramíneas tropicais encontradas no semiárido nordestino, estimada através da técnica de sacos móveis em equinos.

Tratamentos	Coeficiente de digestibilidade aparente (%)					
	MS	PB	FDN	FDA	MO	MM
<i>Brachiaria plantaginea</i> (Link) Hitchc						
Capim Milhã	74,30 ^a	95,70 ^a	66,05 ^a	55,34 ^a	73,29 ^a	82,48 ^a
<i>Chloris orthonoton</i>, Doell						
Capim de Raiz	68,88 ^a	88,92 ^b	63,76 ^a	49,95 ^{ab}	66,95 ^a	84,04 ^a
<i>Cynodon spp.</i>						
Feno de Tifton 85	74,61 ^a	93,50 ^a	70,31 ^a	65,32 ^a	73,42 ^a	86,57 ^a
<i>Urochloa mosambicensis</i>						
Capim Corrente	52,89 ^b	85,89 ^b	39,61 ^b	31,29 ^c	47,35 ^b	81,57 ^a
<i>Aristida adsencionis</i> Linn,						
Capim Panasco	48,40 ^b	93,35 ^a	38,22 ^b	34,19 ^{bc}	50,88 ^b	61,86 ^b
P-valor	<,0001	<,0001	<,0001	0,0002	<,0001	<,0001
CV¹ (%)	9,4	2,1	15,4	17,9	10,1	6,9

Médias seguidas de letras distintas nas colunas indicam diferença entre as gramíneas pelo teste de Tukey (P<0,05);

¹Coefficiente de variação

O capim Panasco apresentou menor coeficiente de digestibilidade para a matéria seca (48,40%) que os capins Tifton 85 (74,61%), Milhã (74,30%) e Raiz (68,88%), embora, não tenha diferido do capim Corrente (52,89%). A digestibilidade da matéria seca foi altamente correlacionada à digestibilidade da fibra em detergente neutro ($R^2=0,89$). A fibra em detergente neutro foi o nutriente mais presente na matéria seca do capim Panasco, logo, sua baixa digestibilidade (38,22%) influenciou negativamente a taxa de desaparecimento da matéria seca.

Segundo Van Soest (1981), o teor de lignina das forragens pode ser considerado o principal fator envolvido na redução da digestibilidade da fibra. Assim, a baixa digestibilidade da fibra em detergente neutro e da fibra em detergente ácido do capim Panasco, possivelmente, deve-se a presença de maiores teores de lignina e carboidratos indigestíveis (Tabela 1), tornando essa gramínea menos digestível que as demais. Reforçando esse resultado, Silva et al. (2009) avaliaram a digestibilidade de forragens através da técnica de sacos móveis em equinos e também encontraram menor digestibilidade da matéria seca nos alimentos com maiores conteúdos de lignina e fibra em detergente neutro.

Por outro lado, o capim Panasco demonstrou alta digestibilidade da proteína bruta (cerca de 93,35%), igualando-se ao capim Milhã (95,70%) e Tifton 85 (93,50%). Provavelmente, esse resultado está relacionado ao menor conteúdo de proteína indigestível em detergente neutro (PIDN) do capim Panasco (Tabela 1).

A digestibilidade da matéria orgânica do capim Panasco foi semelhante à do capim Corrente e inferior (P=0,0001) a digestibilidade dos capins Milhã, Raiz e feno de Tifton

85. Como esse nutriente apresenta relação diretamente proporcional à digestibilidade da matéria seca, tende a acompanhar a digestibilidade da mesma. Silva et al (2009) relataram coeficiente de digestibilidade aparente da matéria orgânica de 52,90% para gramíneas tropicais, semelhante ao encontrado no presente estudo para o capim Panasco de 50,88%.

Em relação à digestibilidade aparente da matéria mineral, apenas a do capim Panasco foi diferente das demais gramíneas. Grande parte das espécies nativas da Caatinga apresenta compostos secundários, cuja síntese e acúmulo estão associados à adaptação dessas plantas à variação edafoclimáticas do *habitat* (ANDRADE et al., 2010) e, em alguns casos, esses compostos se complexam com os minerais, tornando-os indisponíveis para o animal. Um exemplo disso é o oxalato, substância presente em algumas forragens, que se une ao cálcio dietético formando o oxalato de cálcio e impedindo a metabolização desse mineral pelo organismo (MÉNDEZ & RIET-CORREA, 2007).

O capim Corrente também apresentou menor digestibilidade da matéria seca que os capins Milhã, Raiz e Tifton 85. Provavelmente, a colheita mais tardia dessa gramínea, em relação aos demais, influenciou sua baixa digestibilidade, pois à medida que a idade fisiológica da planta avança aumentam as porcentagens de celulose, hemicelulose e lignina, reduzindo a proporção dos nutrientes potencialmente digestíveis e sua digestibilidade (REIS et al., 2005).

A digestibilidade da proteína bruta do capim Corrente (85,89%) foi menor que dos capins Milhã (95,70%), Tifton 85 (93,50) e Panasco (93,35%). A relação folha/caule é um dos principais fatores de perda de qualidade das plantas durante a maturação, interferindo não só na composição química, mas também dificultando a digestibilidade. Queiroz et al (2000) analisaram a digestibilidade *in vitro* da matéria seca de três gramíneas e observaram diferenças entre a digestibilidade da lâmina foliar em relação ao colmo, demonstrando o acúmulo de frações menos digestíveis na parte basal das plantas.

O capim Raiz apresentou digestibilidade da matéria seca semelhante à dos capins Milhã e Tifton 85 e maior que dos capins Corrente e Panasco. Contudo, a digestibilidade da proteína bruta (88,92%) foi menor que dos capins Panasco, Milhã e Tifton 85. Essa baixa digestibilidade proteica do capim Raiz, provavelmente, está relacionada ao alto conteúdo de proteína ligada à fibra, em outras palavras, refere-se a proteína indigestível em detergente neutro que foi de 825,8 g.Kg⁻¹PB, prejudicando a digestibilidade desse nutriente. Uma hipótese é que nas condições de clima semiárido, onde as temperaturas permanecem elevadas por um período de tempo mais prologando, algumas espécies de

fornageiras sofrem reações que podem diminuir a digestibilidade da proteína bruta, com formação de complexos entre proteínas e carboidratos como, por exemplo, a reação de Maillard (BERCHIELLI et al, 2006)

O Tifton 85 apresentou maior digestibilidade da matéria seca que os capins Corrente e Panasco. Já a proteína bruta do Tifton 85 foi mais digestível que dos capins Raiz e Corrente. Apesar de apresentar teores de lignina e fibra indigestível relativamente maiores, quando comparados a maioria das outras forragens, o feno de Tifton 85 foi a gramínea que demonstrou maior digestibilidade dos nutrientes. Considerando que a maior parte da digestão das forragens ocorre através da fermentação microbiana, e a diversidade e proporção dos microrganismos do ceco e cólon dos equinos são diretamente influenciados pela dieta ofertada (GARBER et al., 2020), a maior digestão do Tifton 85 pode estar relacionada ao fato da dieta ofertada aos equinos durante todo o experimento ter sido exclusivamente dessa forragem.

O capim Milhã apresentou maior ($P < 0,05$) digestibilidade para todos os nutrientes. Como o conteúdo de lignina está correlacionado com a digestibilidade pontual das forragens (FUKUSHIMA & HATIFIELD, 2004), o fato de o capim Milhã ter apresentado menores frações indigestíveis que as demais gramíneas, como a lignina, tornou essa forragem mais digestível que os capins Corrente e Panasco. Da mesma forma, a digestibilidade da proteína bruta do capim Milhã foi mais digestível porque na mesma o conteúdo de proteína ligada a fibra foi menor quando comparado aos capins Raiz e Corrente.

5.5 CONCLUSÃO

A digestibilidade dos nutrientes de gramíneas tropicais encontradas no Semiárido nordestino, estimada através da técnica de sacos móveis em equinos, apresenta diferença entre as espécies.

5.6 AGRADECIMENTOS

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Pastagens pela concessão da bolsa de estudos e apoio ao presente trabalho.

5.7 REFERÊNCIAS

ABDOULI, H.; BEN ATTIA, S. Evaluation of a two-stage *in vitro* technique for estimating digestibility of equine feeds using horse faeces as the source of microbial inoculum. *Animal Feed Science and Technology*, v. 132, n. 1–2, p. 155–162, 2007.

ARAÚJO, K.V.; LIMA, J.A.F.; TEIXEIRA, J.C. et al. Determinação da digestibilidade aparente dos nutrientes de alguns concentrados e volumosos para equinos, pela técnica do saco de náilon móvel. *Revista Brasileira de Zootecnia*, v.25, n.5, p.945-956, 1996.

ARAÚJO, K. V. et al. Comparação da Técnica do Saco de Náilon Móvel com o Método de Coleta Total para Determinar a Digestibilidade dos Nutrientes de Alimentos Volumosos em Equinos. *Revista Brasileira de Zootecnia*, v. 29, n. 4, p. 752–761, 2000.

AOAC - ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. 1990. Official methods of analysis. 15. ed. AOAC International. Washington.

BERCHIELLI, T. T. et al. Nutrição de ruminantes. Jaboticabal: Funep, 2006. 583p.

BRANDI, R. A.; FURTADO, C. E. Importância nutricional e metabólica da fibra na dieta de equinos. *Revista Brasileira de Zootecnia*, v. 38, n. SUPPL. 1, p. 246–258, 2009.

BRASIL - FLORA DO BRASIL 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: < <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/> >. Acesso em: 20 Jun. 2019.

DE FOMBELLE, A. et al. Characterization of the microbial and biochemical profile of the different segments of the digestive tract in horses given two distinct diets. *Animal Science*. 77: 293–304. 2003.

FUKUSHIMA, R. S.; HATIFIELD, R.D. Comparison of the acetyl bromide spectrophotometric method with other analytical lignin methods for determining lignin concentration in forage samples. *J. Agric. Food Chem.* 52, 3713–3720, 2004.

GARBER, A.; HASTIE, P.; MURRAY, J.-A. Factors influencing equine gut microbiota: current knowledge. *Journal of Equine Veterinary Science*, p. 1–2, 2020.

GIULIETTI, A. M. et al. Diagnóstico da vegetação nativa do Bioma Caatinga. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente: Universidade Federal de Pernambuco, 2003. p. 48-78.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 2017 Produção da pecuária municipal 2017. Brasil.

LATTIMER, J. M. et al. Effect of yeast culture on *in vitro* fermentation of a high-concentrate or high-fiber diet using equine fecal inoculum in a Daisy II incubator. *Journal of Animal Science*, v. 85, n. 10, p. 2484–2491, 2007.

LOWMAN, R. S. et al. Evaluation of an *in vitro* batch culture technique for estimating the *in vivo* digestibility and digestible energy content of equine feeds using equine faeces as

the source of microbial inoculum. *Animal Feed Science and Technology*, v. 80, n. 1, p. 11–27, 1999.

MASS, R. A. et al. In situ neutral detergent insoluble nitrogen as a method for measuring forage protein degradability: In Situ Neutral Detergent Insoluble Nitrogen as a Method for Measuring Forage Protein Degradability 1. p. 1565–1571, 1999.

MÉNDEZ, M.C.; RIET-CORREA, F. Osteodistrofia Fibrosa. In: RIET-CORREA, F.; SCHILD, A.L.; LEMOS, R.A.A. et al. (Ed.) *Doenças de Ruminantes e Equídeos*. Santa Maria: Pallotti, 2007. v.2, p.289-293.

MOORE-COLYER, M. J. S. et al. The mobile bag technique as a method for determining the degradation of four botanically diverse fibrous feedstuffs in the small intestine and total digestive tract of ponies. *British Journal of Nutrition*, v. 88, n. 6, p. 729–740, 2002.

NRC – National Research Council. 2007 *Nutrients requirements of horses*. National Academy Press, Washington, D.C., 5ed., 100p.

QUEIROZ, D. S.; GOMIDE, J. A.; MARIA, J. Avaliação da Folha e do Colmo de Topo e Base de Perfilhos de Três Gramíneas Forrageiras. 1. Digestibilidade in vitro e Composição Química. *Revista Brasileira de Zootecnia*, v. 29, n. 1, p. 53–60, 2000.

SAS, 2002, *Statistical Analysis System*. Version 9.0. SAS Institute Inc. Cary, NC.

SENGER, C. C. D. et al. Evaluation of autoclave procedures for fibre analysis in forage and concentrate feedstuffs. *Animal Feed Science and Technology*, v. 146, p. 169-174, 2008.

SILVA, V. P. et al. Digestibilidade dos nutrientes de alimentos volumosos determinada pela técnica dos sacos móveis em equinos. *R. Bras. Zootec.* 2009, vol. 38, n. 1, p. 82-89. ISSN 1806-9290.

SIQUEIRA FILHO, J. A. *A flora das Caatingas do Rio São Francisco: história natural e conservação*. Editora Andrea Jakobsson, Rio de Janeiro, Brasil. 552 p. 2012.

SNIFFEN, C. J. et al. A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets: carbohydrate and protein availability. *Journal of Animal Science*, v. 70, n. 12, p. 3562-3577, 1992.

REIS, R. A.; SIQUIERA, G. R.; BERTIPAGLIA, L. M. A.; OLIVEIRA, A. P.; MELO, G. M. P.; BERNARDES, T. F. (Ed). *Volumosos na produção de ruminantes*. Jaboticabal: FUNEP. 2005. p 257-279.

RODRIGUES, L. M. et al. Roughage digestion evaluation in horses with total feces collection and mobile nylon bags. *Revista Brasileira de Zootecnia*, v. 41, n. 2, p. 341–346, 2012.

TARAN, F. M. P. et al. Evaluation of *Saccharomyces cerevisiae* as an anti-fumonisin B 1 additive in a horse digestion model. *World Mycotoxin Journal*, v. 10, n. 2, p. 121–130, 2017.

TILLEY, J.M.A.; TERRY, R. A. A two-stage technique for the *in vitro* digestion of forage crops. J. Br. Grassl. Soc., v. 18, p. 104-111, 1963.

VAN SOEST, P. J. Nutritional ecology of the ruminant. 2.ed. New York: Cornell University Press, 1994. 476p

VAN SOEST, P. J. Limiting factors in plant residues of low biodegradability. Agriculture and Environment, v. 6, p. 135–143, 1981.

VAN SOEST, P. J.; ROBERTSON, J. B.; LEWIS, B. A. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, v. 74, n. 10, p. 3583-3597, 1991.

VANZANT, E. S.; COCHRAN, R.C.; TITGEMEYER, E. C. Standardization of in situ techniques for ruminant feedstuff evaluation. Journal of Animal Science, v.76, p.2717-2729, 1998.